

사용상의 주의사항

1) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- (1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자

2) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것

- (1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- (2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(임상적 경험이 없기 때문에, 니코틴 산아미드 결핍이 명확히 확인된 경우를 제외하고는 복용을 권장하지 않는다)
- (3) 수유부(수유 중에는 복용을 권장하지 않는다)
- (4) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3) 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것

- (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우: 홍조, 가려움증
- (2) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperurisemia: 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
- (3) 우발적으로 과량 복용한 경우
- (4) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

4) 기타 이 약의 복용시 주의사항

- (1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
- (2) 여러 약물 간 발생할 수 있는 상호작용을 방지하기 위해, 처방중인 다른 치료에 대해 의사나 약사에게 반드시 알려야 한다.

5) 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 뚜껑을 꼭 닫아 보관할 것
- (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.