

권위소화제

<일반의약품>

크레아정

【원료약품 및 그 분량】 이 약 1정(781 밀리그램) 중

- 유효성분 :
판크레아틴(EP).....400mg
(전분당화력 250단위/일, 단백소화력 1,500단위/일, 지방소
화력 100단위/일 이상)
우르소데옥시콜산(JP).....20mg
- 기타 첨가제 : 구산알루미늄산마그네슘, 규화미결정셀룰로
스, 라우릴황산나트륨, 스테아릴푸마르산나트륨, 저치환도
히드록시프로필셀룰로오스, 카르나우바납, 콜로이드성이산
화규소, 크로스포비돈, 탭실드주황색(3901558), 탭실드흰색
(11W287),

【성 상】 연한 주황색의 타원형 장용코팅정

【효능·효과】

소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 체한, 소화촉진, 소화불
량으로 인한 위부팽만감

【용법·용량】

만 15세 이상의 성인 : 1회 1정, 1일 3회 식후에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

- 1) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
만 7세 이하의 어린이
- 2) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의
사, 약사와 상의할 것.
(1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
(2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
(3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
- 3) 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의
사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 이 첨부문서를 소지
할 것.

2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

- 4) 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 5) 저장상의 주의사항
(1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
(2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳
에(밀폐하여) 보관할 것.
(3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기
에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 100정/병

※ 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품을
구입하셨을 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 명문제약 홈페이지
또는 소비자 상담전화로 확인하실 수 있습니다.

※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원에
피해구제 신청을 할 수 있습니다.

※ 피해구제 상담(14-3330), 의약품 부작용 신고·피해구제
상담(1644-6223)

☎ 소비자 상담전화 : 080-022-5805(무료전화서비스)

제조·판매원 (작성 연월일 : 25. 03. 11)
(M01)
명문제약주식회사
경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길 26
www.mmp pharm.co.kr