

CHO-A PHARM.CO.,LTD.		DESIGN TEAM
제 품 명	[신규/의약/약국] 마그스더블액션 연질캡슐	
포 장 형 태	제품설명서(공용) · 앞/뒤 양면	
규 격	100(가로)×200(세로)mm	
재 질	모조지 70g/m ²	
색상 및 인쇄	별색 1도(검정), 음쇄인쇄	
인쇄색상기준	☐ 기 지정 표준안 ☐ 교정지 ☐ 현장감리 ☒ 기타 인쇄 설명하게	
전송처	동방에프티엘	전송일자 : 2025. 03. 작업자 : 이지민 차장

육체 피로·근육 통증/경련 개선제



일반의약품

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐 중

- 유효성분 :
 - 토코페롤아세테이트(KP).....300 mg(비타민 E로서 300 IU)
 - 산화마그네슘(KP)400 mg(마그네슘으로서 241.25 IU)
 - 피리독신염산염(KP).....50 mg
 - 벤포티아민(KP).....60 mg(티아민염산염으로서 43.38 mg)
 - 리보플라빈(KP).....50 mg
 - 감마-오리자놀(KP).....5 mg
 - 시아노코발라민(KP).....500 μg
- 첨가제(타르색소) : 청색1호(브릴리안트블루FCF), 적색40호, 적색3호
- 첨가제(동물유래성분) : 백납(별표, 밀랍), 숙신산젤라틴(돼지, 돈피)
- 기타 첨가제 : 농글리세린, 정제수, 폴리소르베이트80, 레시틴, 산화티탄, 공기를

【용법 · 용량】 만 12세 이상 어린이 및 성인 : 1일 2회, 1회 1캡슐 복용

【효능 · 효과】

- 다음 경우의 비타민 E, B₁, B₂, B₆의 보급
 - 육체피로
 - 임신 · 수유기
 - 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
 - 노년기
 - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다.
 - 말초혈행장애 및 경년기시 다음 증상의 완화 : 어깨 · 목결림, 수족저림, 수족냉증(손발이 차가움)
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
 - 각기
 - 눈의 피로
- 마그네슘결핍으로 인한 근육경련

【성상】 미황색 내지 황색의 유상 내용물을 함유한 암적갈색의 장방형 연질캡슐

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 60캡슐, 120캡슐

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- (1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- (2) 만 12개월 미만의 젖먹이
- (3) 심한 증상의 신부전 환자
- (4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- (5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- (1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- (2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- (1) 만 1세 미만의 젖먹이
- (2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- (3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- (4) 심장 · 순환기계기능 장애 환자
- (5) 신장장애 환자
- (6) 저단백혈증 환자
- (7) 임부
- (8) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- (9) 이 약은 적색40호를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

KGMP적격업체

조아제약

↓ 뒷면계속

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- (1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 구역, 구토, 묽은 변, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하
- (2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
- (3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
- (4) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- (5) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
- (6) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부정(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- (7) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
- (8) 우발적으로 과량복용 한 경우
- (9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- (1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
- (2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여할 것.
- (3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
- (4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.
- (5) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항

- (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
- (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【제조회자】 조아제약(주) <http://www.choa.co.kr>

본사 : 서울특별시 영등포구 당산로2길 12 공장 : 경상남도 함안군 함안면 광정로 318

【제 조 자】 동방에프티엘(주) 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 78

【사용기간】 제조일로부터 24개월

【수신자부담고객상담실】 080-988-8888

※ 기타 상세한 것은 의사 또는 약사의 지시에 따르십시오. ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 유효기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국에서 교환하여 드립니다. ※ 본 첨부문서의 내용은 최신 정보 및 허가사항의 변경에 따라 계속 수정되고 있으므로 사용전에 주의깊게 읽어주시고, 의약품과 함께 보관하여 주십시오. ※ 의약품은 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다. ※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr>)를 참조하십시오. ※ 표시되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전처에 전달하십시오. ※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시, 부작용 신고 및 피해구제신청은 한국약품안전관리원에 할 수 있습니다.

【신창방법】 ☎ 1644-6223, 14-3330 | karp.drugsafe.or.kr

【신창대상】 의약품 부작용으로 사망, 장애, 질병 피해를 입은 환자 및 유족

【보상범위】 사망일시보상금, 장례비, 장애일시보상금, 진료비

개정연월일 : 2025. 03. 19 (Rev.0)