

중등도~중증의 양성 전립선 비대증 증상의 치료		전문 의약품
유로가드정		0.5/5mg
두타스테리드, 타다라필		

■ 원료약품 및 분량 : 1정 중

- 유효성분: 두타스테리드(베평구) 0.5mg 타다라필(ECP) 5.0mg
- 첨가제(동물유래성분): 유당수화물(기원: 소, 사용부파: 우유)
- 기타첨가제: 디아일글리콜리보노에틸에테르, 라우릴황산나트륨, 만니톨, 모노엔디글리세리드, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 저지환도하이드록시프로필셀룰로오스, 클로이드싱이산하이드루, 크로스카르멜로소스나트륨, 폴록사머188, 히드록시프로필셀룰로오스

■ 성상

흰색의 방형형 정제

■ 효능·효과

중등도~중증의 양성 전립선 비대증 증상의 치료

■ 용법·용량

성인: 이 약의 권장용량은 1일 1회 1정(두타스테리드 0.5mg 및 타다라필 5mg)이며, 경구투여한다. 이 약은 식사와 관계없이 복용할 수 있고, 매일 거의 같은 시간에 정제를 통째로 삼켜서 복용한다.

(특수 집단)

- 고령 남성에서의 사용
고령 환자에서 용량 조절을 필요로 하지 않는다.
- 신기능 장애가 있는 남성에서의 사용
중증의 신장애가 있는 환자에서 용량조절을 필요로 하지 않는다. 심한 신장애 환자에서 이 약 권장되지 않는다.
- 간 기능 장애가 있는 남성에서의 사용
간장애 환자에서 이 약의 권장용량은 확립되어 있지 않다.
- 소아 및 청소년에서의 사용
18세 미만의 소아에게 사용해서는 안 된다.

■ 사용상의 주의사항

- 경고
 - 여성에게 노출 시 남자 태아에 미치는 위험성
두타스테리드는 피부를 통해서 흡수된다. 따라서 두타스테리드의 흡수 가능성과 남자 태아에게 미치는 태아 기형의 위험 가능성에 대한 임신했거나 임신 가능성이 있는 여성이 이 약을 취급해서는 안 된다. 또, 여성은 이 약을 취급할 때때다 주의해야 하고 이 약과의 접촉을 피해야 한다. 만약 이 약과 접촉한 경우에는 접촉 부위를 즉시 물과 비누로 세척해야 한다.
 - 소아
두타스테리드는 피부를 통해 흡수되므로, 소아는 이 약과의 접촉을 피해야 한다. 만약 이 약과 접촉한 경우에는 접촉 부위를 즉시 물과 비누로 세척해야 한다.
 - 이 약을 투여하여야 하는 경우, 양성 전립선 비대증에 대한 적절한 의료 평가와 함께 잠재적이고 근원적인 원인 측정 및 적절한 치료법을 확인하고 경고, 금기 및 신중투여할 등을 고려하여야 한다.
 - 성행위로 수반되는 신장애에 대한 위험성이 있기 때문에, 타다라필로 치료를 시작하기 전에, 의사는 환자의 심혈관 상태를 확인하여야 한다. 성행위를 시작한 후 심혈관계 질환과 관련된 증상을 경험한 환자는 더 이상의 성행위를 삼가고, 이를 의사와에 알려야 한다.
 - 타다라필 계열의 약물에서 4시간 이상의 지속된 발기 및 지속발기증(6시간 이상의 통증을 수반한 발기)이 드물게 보고되었다. 4시간 이상 발기가 지속될 경우 즉시 의사의 도움(medical assistance)을 구하고도 환자에게 알려주어야 하며, 지속발기증을 즉시 치료하지 않을 경우 음경 조직의 손상 및 발기력의 영구상실을 초래할 수 있다. 타다라필을 투여하기 전이나 투여하는 동안 및 투여한 후 모든 형태의 질산염 제제 또는 NO 공여제(니트로글리세린, 아밀나이트리트, 질산이소소르비드)를 복용하는 경우, 혈압강하 작용이 증가되어 과도하게 혈압이 떨어질 수 있으므로 의사는 이 약을 처방하기 전에 환자가 질산염 제제 및 NO 공여제를 투여하지 않았는지 충분히 확인하여야 하고, 이 약을 투여 중 및 투여 후 질산염 제제 및 NO 공여제를 투여하지 않도록 주의시킨다.
 - 심근경색, 급성 심장지, 불안정한 협심증(unstable angina pectoris), 심실 부정맥(ventricular arrhythmia), 뇌졸중 및 일과성 허혈성 발작(transient ischemic attacks), 흉통, 심계항진, 빈맥을 포함한 중대한 심혈관계 유해사례(cardiovascular events)가 타다라필의 임상연구 및/또는 시판 후 조사 중에 발생하였다. 또한 임상시험에서 고혈압과 저혈압(제약상 저혈압 포함)도 드물게 나타났다. 이러한 유해사례들이 나타난 환자들의 대부분은 이전부터 심혈관계 위험인자들(pre-existing cardiovascular risk factors)을 가지고 있었다. 그러나, 이러한 유해사례들이 심혈관계 위험인자들 또는 타다라필 또는 이러한 인자들의 조합 또는 다른 인자 등과 직접적인 연관이 있는지는 분명히 밝혀지지 않았다.
 - 타다라필을 6~12개월간 매일 25mg/kg/일(20mg의 단위 용량을 투여한 인체에서 관찰된 뇌졸중보다 최소한 3배를 넘는 뇌졸중범위 3.7~18.6) 결과 초래) 및 그 이상의 용량으로 개에 투여했을 때, 일부 개에서 정자형성(spermatogenesis)의 감소를 가져오는 정세관상피(seminiferous tubular epithelium)의 퇴행(regression)이 있었다. 타다라필의 정자형성(spermatogenesis)에 대한 잠재적인 영향을 평가하기 위해, 타다라필 10mg을 6개월간 매일 복용하거나, 20mg을 각각 6개월 또는 9개월간 매일 복용한 남성들에서 37가지 임상연구들이 실시되었다. 이 중 2개의 연구에서 타다라필의 치료와 관련하여 양성적 타당성은 없어 보이는 정자 숫자와 질도의 감소가 관찰되었다. 정자 운동성, 형태, 난포 자극호르몬(follicle stimulating hormone)의 다른 척도들의 변화는 관찰되지 않았다(13, 3천분자를 위한 참조, 1) 약리작용 참조).
 - 좌심실유출폐색(예: 대동맥 협착증 및 특발성 비후성 대동맥판 하부 협착증)이 있는 환자는 PDE5 저해제를 포함한 혈관확장제의 작용에 민감할 수 있다.

2. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 여성
- 18세 미만의 소아
- 타다라필, 두타스테리드(다른 5α-reductase 억제제를 포함한다) 및 이 약의 성분에 과민증이 있는 환자
- 어떠한 형태의 유기 질산염(organic nitrate) 제제라도 정기적 및/또는 간헐적으로 복용하는 환자에게는 타다라필의 투여가 금기이다. 임상시험에서 타다라필(tadalafil)은 질산염(nitrate)의 저혈압 작용을 증가시키는 것으로 나타났다. 타다라필은 혈관확장 성질을 가지므로, 일시적으로 혈압을 약간 감소시키며 그 결과 질산염의 혈압하하 작용을 증가시킨다. 이것은 질소산화물(nitric oxide)/cGMP 경로에 대한 질산염과 타다라필의 복합 효과의 결과로 판단된다. 타다라필은 성행위가 권장되지 않는 심장 질환(cardiac disease)이 있는 남성에게 사용해서는 안 된다. 의사는 이전부터 심혈관계 질환이 있는 환자에서 성 행위로 인한 잠재적인 심장 위험(cardiac risk)을 고려하여야 한다.
- 심혈관계 질환이 있는 다음의 환자군은 임상시험에 포함되지 않았으므로 타다라필의 사용이 금기이다.
 - 최근 90일 이내에 심근경색(myocardial infarction)이 있었던 환자
 - 불안정한 협심증(unstable angina) 또는 성교(sexual intercourse) 중에 발생한 협심증(angina)이 있었던 환자
 - 최근 6개월 동안 New York Heart Association Class 2 또는 그 이상의 심부전(heart failure)이 있었던 환자
 - 조절되지 않는(uncontrolled) 부정맥(arrhythmias), 저혈압(90/50mmHg), 또는 조절되지 않는 고혈압(170/100mmHg) 환자
 - 최근 6개월 이내에 뇌졸중(stroke)이 있었던 환자
- 색소성 망막염을 포함하여 이미 알려진 유전적인 퇴행성 망막질환자는 임상시험에 포함되지 않았으므로 타다라필의 사용이 권장되지 않는다.
- 타다라필과 다른 발기부전 치료 요법의 병용에 대한 안전성과 유효성이 연구되지 않았으므로 다른 발기부전 치료요법의 병용 투여는 권장되지 않는다.
- 이전의 PDE5 저해제 복용 여부와 관계없이 비동맥관발허혈성시신경증(Non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy, NAION)으로 인해 한쪽 눈의 시력이 손실된 환자에게는 타다라필을 투여하면 안 된다.
- 타다라필을 포함한 PDE5 저해제와 GC 자극제(Guanylate Cyclase Stimulator)(예: 리오시구알)를 병용투여하는 경우, GC 자극제(Guanylate Cyclase Stimulator)의 혈압강하효과를 증가시킬 수 있으므로, 두 약물의 병용투여는 금기)이다.
- 이약은 당뇨병과 관련이 있으므로, 갈락토스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 알코올-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 임상을 계획하고 있는 성인 남성(두타스테리드는 생식능에 영향을 줄 수 있으므로 의사의 판단하에 신중히 투여)
- 요전류량이 크거나 중증 요류 감소가 나타나는 환자
이러한 환자의 경우에는 5α-reductase 억제제 투여가 바람직하지 않을 수 있고 요폐를 주의깊게 모니터링해야 한다.
- 간장애 환자
두타스테리드의 약동학에 간장애가 미치는 영향은 연구된 바 없다. 두타스테리드 는 광범위하게 대사되고 반감기가 약 3-5주이므로, 간기능에 이상이 있는 환자에게는 두타스테리드를 주의하여 투여해야 한다.
중증 간기능부전 환자(Child-Pugh Class C)에서 타다라필의 안전성에 대한 임상자료는 제한적임으로 의사는 신중하게 개개의 유익성/위험성(benefit/risk)을 평가하여야 하며, 중증 내지 중증도의 간기능 장애 환자에서 타다라필의 용량은 10mg을 초과해서는 안 된다. 간 장애가 있는 한다면에 타다라필 1일 1회 투여 용량에 대한 이용 가능한 자료가 없으므로 처방하는 경우, 의사는 신중하게 개개의 유익성/위험성(benefit/risk)을 평가하여야 한다.
- 신장애 환자
중간 및 타다라필 노출(AUC)과 제한적인 임상자료, 투석에 의한 클리어런스 능력 부족으로 타다라필 1일 1회 용법은 심한 신장애를 지닌 환자에게는 권장되지 않았다. 양성 전립선 비대증 환자에서 한하여 중증도의 신기능 장애가 있는 환자에서 타다라필의 임상자료는 제한적이므로 신중하게 투여하여야 한다.
- 강력한 CYP3A4 억제제와 병용투여
두타스테리드와 병용위해에 대사될에도 불구하고 대사와 관련하여 약물상호작용에 관한 시험을 실시하지 않았으며 강력한 CYP3A4 억제제의 영향을 시험하지 않았다. 약물 상호작용의 가능성 때문에 강력한 CYP3A4 효소 억제제(예, 리토나비르)를 만성적으로 투여하는 환자에서 이 약을 투여할 때는 주의하여야 한다.
강력한 CYP3A4 저해제(ritonavir, saquinavir, zalcitabine, zalcitabine, erythromycin)를 복용하는 환자에게 타다라필을 병용투여시 타다라필의 노출(AUC)의 증가가 관찰되었으며 주의하여야 한다. 타다라필과 강력한 CYP3A4 저해제를 병용투여할 경우에는 타다라필의 투여용량을 최고 10mg을 초과하지 않도록 하며, 이 약 투여 후 72시간 이내 재투여하여서는 안 된다.
- 알약 차단제 및 항고혈압제를 투여받은 환자: 의사는 타다라필과 알약차단제 및 항고혈압 약물의 혈압강하 효과를 강화시킬 수 있는 기능성에 대해 환자와 논의해야 한다. PDE5 저해제와 알약차단제와 병용되는 경우 주의가 요구된다. 타다라필을 포함한 PDE5 저해제, 그리고 알파아드레날린성 차단제는 모두 혈압강하 효과가 있는 혈관 확장제이다. 혈관 확장제가 병용되는 경우, 혈압에 대한 상하 효과가 나타날 수 있다. 일부 환자에서, 이들 두 약물 계열의 병용은 혈압을 유의하게 강하게 저상성 저혈압(예를 들어, 기절)으로 이어질 수 있으므로 다음을 고려하여야 한다.
 - 양성 전립선 비대증 치료에 대하여 알약차단제와 타다라필의 병용투여에 관한 한 유효성은 적절한 연구되지 않았으며, 혈압강하를 유발하는 복합 작용의 잠재적 혈관확장 효과로 인해, 양성 전립선 비대증 치료에 있어 타다라필과 알약차단제의 병용은 권장되지 않는다.
- 양성 전립선 비대증에 대한 알약차단제 요법을 받는 환자는 양성 전립선 비대증 치료를 위하여 1일 1회 용법의 타다라필을 시작하기 전에 알약차단제 사용을 중단해야 한다.
- 타다라필에 대해 비선경전 근치전립선적절술(radical non-nerve-sparing prostatectomy)을 받은 환자에서 효과 여부는 알려지지 않았다.
- 음경에 해부학적으로 기형인 환자(강형성(angulation), 해면 섬유증(cavernosal fibrosis) 또는 Peyronie disease) 또는 음경강직증의 소인이 될 조건을 가진 환자(경성저혈구빈혈(sickle cell anemia), 다발성골수종(multiple myeloma) 또는 백혈병)에게는 타다라필을 포함한 발기부전치료제를 신중히 투여하여야 한다.

4. 이상반응

1) 두타스테리드/타다라필 복합제

다음의 이상반응이 무작위 배정된 양성 전립선 비대증 환자를 대상으로 수행한 이중맹검, 이중위약 3군(시험군, 두타스테리드 투여 대조군, 타다라필 투여 대조군) 병용 임상시험에서 관찰되었다. 약물과의 인과관계에 상관없이 발현된 이상반응 중 흔하게(1% 이상) 관찰된 이상반응을 기관계에 따라 분류하여 제시하였다(표 1).

임상시험 도중 가장 흔하게 발현되는 이상반응은 COVID-19, 두통, 소화불량 증상 등이었다.

[표 1] 임상시험에서 1% 이상 보고된 이상반응

	이 약(N=219) N(%)	두타스테리드0.5mg(N=217) N(%)	타다라필5mg(N=219) N(%)
기관계 및 이상반응			
감염 및 기생충 감염			
COVID-19	12(5.48)	5(2.30)	7(3.20)
각종 감염 장애			
두통	8(3.65)	3(1.38)	6(2.74)
아지러움	4(1.83)	3(1.38)	2(0.91)
근골격 및 결합 조직 장애			
근육통	4(1.83)	1(0.46)	2(0.91)
관절통	3(1.37)	2(0.92)	0
각종 위장관 장애			
소화 불량	5(2.28)	0	5(2.28)
각종 심장 장애			
두근거림	2(0.91)	1(0.46)	4(1.83)
대사 및 영양 장애			
고지혈증	4(1.83)	1(0.46)	1(0.46)
피부 및 피하 조직 장애			
소양증	0	1(0.46)	3(1.37)

이 약에서 그 밖에 1% 미만으로 보고된 이상반응을 기관계 별로 분류하면 다음과 같다.

- 감염 및 기생충 감염: 칸 농양, 급성 부비염, 기관지염, 농기전, 대상 포진, 무좀, 비인두염, 인후두염, 치주염
- 각종 신경계 장애: 만성 경증성 탈수증 다발 신경근 병증, 감각 저하, 다발 신경증, 신경근 병증, 얼굴 마비, 지각 이상
- 근골격 및 결합 조직 장애: 등허리 통증, 경부 통증, 골관절염, 근육 약화, 관절 병증, 발가락 근막염, 사지 통증, 척추 내 유골 조직 장애
- 각종 위장관 장애: 위식도 역류 질환, 결장염, 사해부 팽창, 과민성 장 증후군, 복부 팽창, 상복부 통증, 연하 곤란, 오심, 위염, 장 괴사
- 호흡기, 흉곽 및 종격 장애: 발성 장애, 코 막힘, 호흡 곤란
- 각종 혈관 장애: 정맥류 정맥, 고혈압, 홍조, 열감 홍조
- 각종 눈 장애: 눈배장, 눈 건조, 망초성 망막 병증, 망막 결절성, 별 모양 유리체증, 수정체후낭 혼탁, 안검염
- 대사 및 영양 장애: 통풍
- 전신 장애 및 투여 부위 병태: 흉부 불편감, 사망, 흉통
- 피부 및 피하 조직 장애: 두드러기, 발진, 탈모
- 신장 및 요로 장애: 방광 증후, 질박 요실금, 질박뇨
- 생식계 및 유방 장애: 남성의 여성형 유방, 유방 종괴, 유방 통증, 전립선 비증
- 임상 장애: 헤모글로빈 감소, 혈액 중성 지방 증가
- 양성, 악성 및 상체 불량의 신장애(남성 및 여성 포함): 재발성 간암, 비부비통 유두종, 결장 직장 선종
- 간담도 장애: 담낭염, 간염, 간 지방증, 담낭 장애
- 순산, 중독 및 시술 합병증: 인공 삽입물 주위 골절, 눈 타박상, 연골 손상
- 귀 및 미로 장애: 귀 통증
- 각종 전신 장애: 우울증, 체형 양극성 장애, 환청할 불만 및 우울 장애
- 외과적 및 내과적 시술: 백내장 수술

2) 개개 주성분에 대한 추가정보

비록 이 약을 투여한 임상시험에서 관찰되지 않았더라도, 이 약 복용 시 개개의 주성분에 대하여 보고된 이상반응이 나타날 수 있다. 추가적인 이상반응 정보는 두타스테리드 및 타다라필 단일제 허가사항을 참조한다.

○ 두타스테리드

- 대부분의 이상반응은 경증 또는 중증증이고, 일반적으로 두타스테리드 투여군과 위약 투여군 모두에서 투여하는 동안에 회복되었다. 두 투여군에서 시험하여 중단한게 한 가지 빈번한 이상반응은 생식기계와 관련 있었다.
- 임상시험에서 나타난 이상반응
양성전립선 비대증 임상시험에서 두타스테리드 단독 투여시 나타난 이상반응
상: 간의 위약대조 3상 임상시험에서 4,300명 이상의 양성전립선 비대증 남성 피험자를 위약 또는 두타스테리드 0.5mg를 투여하도록 임의배정하였다. 2,167명중 이 약을 투여하였는데 이중 1,972명이 1년간, 1,510명이 2년간 이 약을 투여하였다. 피험자의 연령은 47~94세(평균 66세)였고, 평균 11.3%를 나타냈다. 신장에 결친 투여 기간 376월(각 시험군의 9%)이 이상반응으로 인하여 시험에서 탈락하였는데, 대부분이 생식기계와 관련 있었다. 시험하여지 기하할 가능성이 있는 이상반응으로 시험자가 판단하여 시험약을 중단한 경우는 두타스테리드 투여 피험자의 4%, 위약 투여 피험자의 3%에서 나타났다. 아래와 같이 연구자가 두타스테리드와 관련 있는 것으로 판단한 위약반응(1%이상)의 빈도도 보고되었다.
3상 위약대조 임상시험에서 두타스테리드 투여시와 비교하여 더 자주 보고되었다.

1%이상의 빈도로 발생한 두타스테리드와 관련 있는 이상반응들

	투여 1년 동안 나타난 빈도	투여 2년 동안 나타난 빈도
이상반응	위약(n=2158)	두타스테리드(n=2167)
발기부전*	3%	6%
성욕 감소*	2%	4%
사정 장애*	<1%	2%
여성형 유양†	<1%	1%

* 이러한 생기능 이상반응들은 두타스테리드 투여와 관련이 있다(단독 투여 및 탈수소신과의 병용요법을 포함).
† 이상반응들은 투여 중단 후에도 지속될 수 있다. 이에 대한 두타스테리드의 역할은 알려지지 않았다.
† 유방 압통과 유방 비대 포함

2년 동안의 공개연정시험에서 이상반응 프로파일의 변화는 없었다.

- 장기 투여
 - 생식기계 및 유방 장애: 두타스테리드에 대한 3건의 주요 위약 대조 양성 전립선 비대증 임상시험에서, 각각 4년의 기간 동안, 투여 기간의 증가에 따른 약물 관련 생기능 이상반응(발기부전, 성욕감소, 사정장애) 또는 유방 장애의 발생 증가에 대한 증거는 없었다. 이들 3건의 임상시험 중에서, 두타스테리드 투여군에서 1건, 위약 투여군에서 1건의 유방암이 발생하였다. 4년간의 CombAT 임상시험 및 4년간의 REDUCE 임상시험에서는 어느 군에서도 유방암이 보고되지 않았다. 두타스테리드의 장기 투여와 남성 유방 신생을 발생 간의 관계는 현재까지 알려지지 않았다.
 - 고등급 전립선암: REDUCE 임상시험은 혈청 PSA 수치가 2.5ng/mL~10.0ng/mL이면서 이전 6개월 이내에 전립선 생체조직검사에서 음성이었던 50~75세의 남성 8,231명이 등록된 무작위 이중 눈가림, 위약 대조 임상시험이었다. 피험자들은 무작위배정으로 위약(N=4,126) 또는 두타스테리드 0.5mg(N=4,105)을 1일 1회 최대 4년간 투여받았다. 평균 연령은 63세였고, 91%가 코카시안이었다. 피험자들은 프로토콜에 명시된 대로 치료 2년째 및 4년째에 예정된 전립선 생체조직검사를 받거나, 임상상의 판단에 따라 예정되지 않은 시점에서 원인 규명을 위한 생체조직검사를 받았다. 위약을 투여 받은 남성(0.5%)에 비해 두타스테리드를 투여 받은 남성(1.0%)에서 Gleason 등급 8~10의 전립선암 발생 빈도도가 더 높았다. 다른 5α-reductase 억제제(피나스테리드 5mg, 크로스카)에 대한 7년간의 위약 대조 임상시험에서, Gleason 등급 8~10의 전립선암에 대하여 유사한 결과가 관찰되었다 (피나스테리드 1.8% vs. 위약 1.1%), 두타스테리드를 투여 받은 전립선암 환자에서 임상적 유익성은 입증되지 않았다.
- 사면 후 치료
임상시험을 기관 및 빈도별로 정리하였다. 빈도는 다음과 같다: 매우 흔하게(≥1/10), 흔하게(≥1/100~1/10), 때때로(≥1/1,000~1/100), 드물게(≥1/10,000~1/1,000), 매우 드물게(1/10,000). 이들 이상반응들은 규모가 알려지지 않은 집단으로부터 자발적으로 보고된 이상반응도 포함하고 있기 때문에 실제 빈도와 다를 수 있다.
두타스테리드 시판 후 보고된 이상반응은 다음과 같다.
① 면역기계 : 매우 드물게 발진, 가려움증, 두드러기, 국소 부종, 심각한 피부반응, 혈관 부종 등을 포함한 알레르기 반응
② 정신계 : 매우 드물게 우울한 기분
③ 피부 및 피하조직 : 드물게 탈모증(주로 체모 감소), 다모증
④ 생식기계 및 유방 : 매우 드물게 고환통, 고환 부기
⑤ 신생 조직물 : 남성 유방암
- 국내 시판 후 조사
국내에서 제1상사를 위하여 6년(2004.04.23~2010.04.22) 동안 양성 전립선 비대증 환자 3,870명을 대상으로 실시한 시판 후 사용성적조사결과
- 유해사례의 발현율은 인과관계와 상관없이 3.8%(146명/3,870명, 1982년로 보고되었다. 이 중 약물과 인과관계를 배제할 수 없는 약물유해반응 발현율은 3.4%(131명/3,870명, 171건로 발기부전 1.9%(72명/3,870명, 752), 성욕감소 1.3%(49명/3,870명, 49건), 사정장애 0.8%(29명/3,870명, 29건), 소화불량 0.1%(5명/3,870명, 52), 여성형유방 0.1%(5명/3,870명, 52), 불면증 0.1%(2명/3,870명, 2 건), 복통, 설사, 양치불편, 알레르기, 복, 비출혈 각 0.03%(1명/3,870명, 1건)이 보고되었다. 중대한 유해사례 발현율은 인과관계와 상관없이 0.1%(5명/3,870명, 52건로 혈전성뇌졸중, 폐렴, 폐색전증, 폐렴, 설사가 보고되었다.
예상하지 못한 유해사례 발현율은 인과관계와 상관없이 0.5%(20명/3,870명, 28건)로 구강건조증 3건, 변비, 복통, 불면증, 설사 각 2건, 경련, 구안면이상운동, 구도, 대장염증, 명치불편, 무력증, 비출혈, 심부정맥혈전증, 열, 오한, 위식도 역류, 치질, 통증, 폐렴, 폐색전증, 폐렴, 혈전성뇌졸중 각 1건이 보고되었으며 이 중 약물과 인과관계를 배제할 수 없는 약물유해반응의 발현율은 0.16%(6명/3,870명, 7 건)로 불면증 2건, 비출혈, 복통, 설사, 명치불편, 열 각 1건이 보고되었다.
2년 이상 두타스테리드를 투여한 장기사용자 76명을 대상으로 하리구름분석을 실시한 결과, 유해사례 발현율은 인과관계와 상관없이 7.89%(6명/76명, 102건)로 보고되었다. 이 중 약물과 인과관계를 배제할 수 없는 약물유해반응 발현율은 5.3%(4명/76명, 52건)로 성욕감소 2건, 발기부전, 소화불량, 사정장애 각 1건이 보고되었다. 중대한 유해사례는 인과관계와 상관없이 폐색전증, 폐렴 각 1건이 보고되었으며, 예상하지 못한 유해사례는 인과관계와 상관없이 폐색전증, 구안면이상운동, 고강건조증, 폐렴 각 1건이 보고되었다.
- 두타스테리드에 대한 국내 제1상사 유해사례와 자발적 부작용 보고자료를 국내 시판 허가된 모든 약물을 대상으로 보고된 유해사례 보고자료와 제1상사 종로지점에서 통한 평가한 결과, 다른 모든 약물원에서 보고된 유해사례에 비해 이 약에서 통계적으로 유의하게 많이 보고된 유해사례 중 새로 확인된 것들은 다음과 같다.
다만, 이 결과가 해당증분과 다음의 유해사례간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
- 피부와 부속기관 장애: 여드름, 피부반응
- 시각장애: 시각이상
- 간 및 담도계 질환: 지방간
- 대사 및 영양 질환: 갈증
- 비뇨기계 질환: 소변이상, 혈뇨
- 생식기능 장애(남성): 정맥이상
- 신생물: 위양성

○ 타다라필에서 수집된 정보

- 임상 시험 경험
양성 전립선 비대증과 양성전립선비대증 발기부전을 동반한 환자에 대한 1일 1회 용법 12주 기간의, 3건의 위약-대조 제 3상 임상시험(이 중 2건은 양성전립선 비대증 환자, 나머지 1건은 양성전립선비대증 및 발기부전을 동반한 환자에서, 타다라필을 투여받은 환자의 평균 연령은 63세 (44~93 세)였고 이상반응으로 인한 중단율은 3.6%인 반면, 위약 투여 환자에서는 1.6%였다. 적어도 타다라필을 투여받은 2명의 환자에 의해 보고된 치료중단을 유발한 이상반응으로는 두통, 상복부 통증, 근육통이다. 다음의 이상반응이 보고되었다(표2 참고).
표2: 양성 전립선 비대증에서 1일 1회 용법의 타다라필의 12주 치료 기간의, 3건의 위약-대조 임상 시험에서 1일 1회 용법의 5mg 치료 환자의 ≥1%에서 보고되고 위약 또는 빈도로 나타난 약물치과 관련 이상반응 (2개의 양성 전립선 비대증 임상과 1개의 양성 전립선 비대증 발기부전에 대한 임상 포함)

이상반응	위약(N=576)	타다라필 5mg(N=581)
두통	2.3%	4.1%
소화불량	0.2%	2.4%
요통	1.4%	2.4%
비인두염	1.6%	2.1%
설사	1.0%	1.4%
팔다리 통증	0.0%	1.4%
근육통	0.3%	1.2%
어지러움	0.5%	1.0%

추가적으로, 양성 전립선 비대증과 발기부전 및 양성 전립선 비대증 대조 임상시험에서 덜 빈번한 이상반응(1%)으로는 위약도 역류, 상복부 통증, 오심, 구도, 관절통, 근육연축(muscle spasm)이 있다.
오통 또는 근육통은 타다라필 단일제의 허가사항에 기재된 빈도로 보고되었다. 타다라필의 임상 약리 시험에서, 오통 또는 근육통은 일반적으로 투여 후 12~24시간 후에 발생하였고, 일반적으로 48시간 이내에 소실되었다. 타다라필 투여와 관련된 오통/근육통은 확산 양측 하부, 둔부 대퇴 또는 등허리 근육 불편의 특징을 나타내며, 환약이외(예로 누움)에 의해 악화되었다. 일반적으로, 통증은 경증 또는 중증증으로 보고되었고, 의학적 치료 없이 사라졌으나, 중증의 통증은 낮은 빈도로 보고되었다(모든 보고의, 5%). 의학적 치료가 필요할 때, 아세트아미노펜 또는 비스테로이드성 소염제가 일반적으로 효과적이지만, 치료 요하는 피험자의 밀도에서, 경도의 마약성(예, 코데인) 진통제가 사용되었다. 일반적으로 필요 시 용법으로 타다라필을 투여하면 모든 환자의 약 0.5%가 오통/근육통의 증상을 치료에 투여를 중단하였다. 1년간 공개 연정 시험에서, 오통과 근육통은 환자의 각각 5.5%와 1.3%에서 보고되었다. 영중, 근육 손상 또는 신소상에 대한 평가를 포함한 진단적 검사 결과, 의학적요로 유발한 기증 병인의 증거는 없었다. 양성 전립선 비대증, 양성 전립선 비대증/발기부전에 대한 이 약의 1일 1회 용법에서 발생율은 표 2에 서술하였다. 타다라필 1일 1회 사용에 관한 시험에서, 오통과 근육통의 이상반응은 일반적으로 경증 또는 중증증 이었고, 모든 적응증에서 중단율은 1%(환자).

타다라필을 투여한 모든 시험들에서 색각 변화는 드물었다(환자의 0.1%). 발기부전에 필요 시 복용요법에 대한 위약-대조 임상시험에서, 이 약을 투여 받은 65세 이상의 환자들에게서 설사가 더욱 빈번하게 보고되었다. (2.5%)

다음은 1일 1회 용법 또는 필요 시 용법으로 복용한 타다라필의 대조 임상 시험에서 보고된 추가적인, 덜 빈번한 이상반응(2%)을 나타낸 것이다. 이러한 이상반응들과 타다라필과의 인과적 관련성은 확실하지 않다. 이 목록에서 제1면된 것은 경미하고, 약물 사용과 관련 기능성이 없으며 정확하지 않아서 의미가 없는 사례들이다.

- 전신: 근육력, 안면부종, 피로, 통증, 말초부종
- 심혈관계: 협심증, 흉통, 저혈압, 심근경색, 기립성 저혈압, 심계항진, 실신, 빈맥
- 소화기계: 간기능 검사 수치 비정상, 구내건조, 연하곤란, 식도염, 위염, GGT 증가, 묽은 변, 오심, 상복부 통증, 구도, 위식도 역류, 치질성 질환, 비출혈, 직장출혈
- 근골격계: 관절통, 목 통증
- 신경계: 어지러움, 감각저하, 불면증, 이상강각, 졸음, 현기증
- 신장 및 비뇨기계: 신장애
- 호흡기계: 호흡곤란, 비출혈, 인두염
- 피부: 가려움, 발진, 발한
- 안과: 시야 흐림, 색각이상, 결막염(결막 충혈 포함), 눈 통증, 눈물 분비 증가, 눈꺼풀 부종
- 청각: 감각스러운 청력 감소 또는 상실, 이명
- 비뇨생식기계: 발기 증가, 자발적 음경 발기

2) 해외 시판 후 사용 경험

다음 이상반응은 타다라필의 승인 후 사용 기간 중 확인되었다. 이러한 이상반응은 불특정 크기의 모집단으로부터 자발적으로 보고되었으며, 항상 약물 노출과의 인과적 관련성을 확립하거나, 이들의 빈도를 신중하게 평가할 수 있는 것은 아니다. 이러한 이상반응들은 중대성, 보고 빈도, 병력한 다른 원인이 없음 또는 이들 인자들의 복합작용으로 인해 발생되었다.

심혈관 및 비혈관계- 타다라필의 사용과 일시적으로 관련이 있는 것으로는 심근경색, 심장 돌연사, 뇌졸중, 흉통, 심계항진, 심실 부정맥 및 빈맥을 포함한 중대한 심혈관계 이상반응이 시판 후 보고되었다. 이들 환자들은 모두는 어지러움 대부위 기증에 심혈관계 위험 인자가 있었다. 이러한 이상반응들 중 대부분은 성행위 중 또는 직후에 발생한 것으로 보고되었고, 일부는 성행위 없이, 타다라필 사용 직후에 발생한 것으로 보고되었다. 다른 이상반응들은 타다라필 사용 및 성행위 후 수시간 내지 수일 후에 발생한 것으로 보고되었다. 이러한 이상반응들이 타다라필, 성행위, 환자의 기존 심혈관계 질환과 직접적으로 관련이 있는지, 이러한 인자들의 복합적 요소들과 관련이 있는지 또는 다른 인자들과 관련이 있는지 여부는 확인할 수 없다(1, 참고 참조)

전신- 두드러기, 스티븐-존슨 증후군, 표피 박락성 피부염을 포함한 과민 반응
신경계- 편두통, 발작 및 발작의 재발, 일과성전계기역상실증

안과- 시야 결손, 안막 병색, 망막 동맥 폐색, 망막 동맥 폐색, 영구적 시력 상실을 포함한 시력 감소의 원인이 되는 비동맥관발허혈성시신경증 (Non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy [NAION])이 타다라필을 포함한 PDE5 저해제의 사용과 시기적으로 관련하여 시판 후 드물게 보고되었다. 이러한 환자들은 모두는 어지러움 대부분이 기존에 다음을 포함했(단시) 이에 한정되지는 않음) NAION의 발현에 대한 해부학적 위험인자 또는 혈관 위험 인자를 가지고 있었다: 낮은 유위항혈 비율(flow/cup disc ratio, crowded disc), 50세 이상, 당뇨병, 고혈압, 광장 동맥 질환, 고지혈증, 흡연. (5, 일반적 주의 함 참조)

청각- 시판 후 타다라필을 포함한 PDE5 저해제의 사용과 시기적으로 연관성이 있는 것으로 감각소실성 청각 상실 또는 감소의 증거가 보고되었다. 일부 증례에서, 청각 이상반응에 중요한 역할을 할 수 있는 의학적 상태 및 기타 인자들이 보고되었다. 많은 증례에서, 의학적 추적관찰 정보는 제한적이었다. 이렇게 보고된 이상반응이 타다라필의 사용과 직접적으로 관련이 있는지, 외악의 청각 상실에 대한 기존 위험 인자와 관련이 있는지, 이러한 인자들의 복합적 요소에 의해 것인지, 다른 인자에 의한 것인지 여부는 확인할 수 없다 (5, 일반적 주의함 참조)

비뇨생식기계- 지속발기증(1, 경고 참조)

연역제- 혈관부종

타다라필 1일 1회 투여시 심전도 이상과 일차성 동서맥(Primarily sinus bradycardia)이 위약군보다 약간 늦게 발현되었다. 대부분 심전도 이상은 이상반증과 무관하였다.

타다라필 5mg 단일제의 국내 시판 후 조사결과
국내에서 제1상사를 위하여 4년 동안 637명의 전립선비대증 환자를 대상으로 실시한 시판 후 조사 결과, 이상사례 발현율은 약과의 인과관계에 상관없이 2.04%(13명/637명, 152건)로 나타났다. 이 중 약물과의 인과관계를 배제할 수 없는 약물이상반응 발현율은 1.26%(8명/637명, 8건) 이었다.

- 약물이상반응은 두통, 안면통증 각 0.31%(2명/637명)22건, 홍조, 사지불편, 안면부종, 정맥각소, 각 0.16%(1명/637명)1건으로 조사되었다.
- 중대한 약물이상반응은 없었다.
- 예상하지 못한 약물이상반응은 사지불편, 정맥각소 각 0.16%(1명/637명)1건으로 보고

- 심부전
 - 두 개의 4년간의 임상시험에서 두타스테리드와 α -치탄제(주로 탈스르산)를 병용 투여한 환자에서 심부전(주로 심부전 및 돌출성 심부전으로 보고된 이상반응)의 빈도가 병용투여하지 않은 환자보다 더 높게 나타났다. 이들 두 임상시험에서 심부전의 빈도는 낮았으며($\leq 1\%$) 두 시점에서 다르게 나타났다. 심혈관계 이상반응의 전체적인 빈도에서의 불균형은 두 시점 모두에서 관찰되지 않았다. 두타스테리드(단독 또는 α -치탄제와 병용투여시)와 심부전의 인과관계는 확립되지 않았다.

○ 타다라필

- 환자의 빈혈학 또는 양쪽 눈에서 갑작스러운 시각 상실이 발생하는 경우, 의사는 타다라필을 포함한 phosphodiesterase type 5 (PDE5) 저해제의 사용을 중지할 것을 환자에게 권고하고 의학적인 주의를 기울여야 한다. 이러한 증상은 영구적인 시각 상실을 포함한 시각 감퇴의 원인이 될 수 있는, 드물게 나타나는 질병인 비동맥전방혈합상신경증(Non-arteritic anterior ischemic optic neuropathy, NAION)의 징후가 될 수 있으며, 이는 시판 후 조사에서 드물게 보고되었고 PDE5 저해제의 투여와 정맥적인 상관성이 있는 것으로 나타났다. 발표된 문헌에 따르면, 비동맥전방혈합상신경증의 연간 발생률은 50세 이상의 남성에서 100,000명당 2.5~11.8건이다. 한 중개-고차 관찰 연구에서 NAION 발현 직전에는 6 반갑기 이내) PDE5 저해제 계열을 사용한 경우의 NAION 위험이 그보다 앞선 기간에 PDE5 저해제를 사용한 경우와 비교하여 평가되었다. 연구 결과 NAION 위험이 약 2배 증가하는 것으로 제시되었으며, 위험 추정치는 2.15 (95% CI 1.06, 4.34)였다. 유사한 시험에서도 일관된 결과가 보고되었으며, 위험 추정치가 2.27 (95% CI 0.99, 5.20)이었다. 이들 시험에서는 "임진전" 사신경 유두의 존재와 같은 NAION의 기타 위험 요인이 NAION 발생에 기여했을 수 있다. 시판 후의 드문 보고 또는 관찰 연구에서 PDE5 저해제 사용과 NAION의 관련성이 PDE5 저해제 사용과 NAION 사이의 인과관계를 뒷받침하지는 않는다. 의사는 기존의 비동맥전방혈합상신경증 위험 인자가 있는 환자들에게 PDE5 저해제 투여에 의해 유해한 영향을 받을 수 있는지 여부를 고려해야 한다. 이미 비동맥전방혈합상신경증을 경험한 적이 있는 사람의 경우, 비동맥전방혈합상신경증 재발의 위험이 더 높다. 따라서, 이런 환자들에게 타다라필을 포함한 PDE5 저해제를 투여하는 경우 주의를 기울여야 하며, 기대되는 유익성이 위험을 상회하는 경우에만 투여해야 한다(4, 이상반응 항 참조).
- 타다라필은 출혈 이상 또는 활동성 소화성궤양 환자에게 투여한 경향이 없다. 비록 타다라필이 건강한 자원자에게서는 출혈시간을 연장시키지 않는 것으로 나타났지만, 출혈이상 또는 활동성 소화성궤양 환자에게는 유익성/위험성을 평가한 후 신중히 투여한다.
- 타다라필과 알코올은 모두 경미한 혈관확장 작용이 있으므로 병용투여시 혈압강하 작용이 증강될 수 있다. 의사는 많은 양의 알코올과 타다라필의 병용투여시 심장사 증가, 혈압 감소, 어지럼증, 두통 등 기립성 저혈압을 경험할 수 있음을 환자에게 알려주어야 한다.
- 갑작스러운 청력 감퇴 또는 난청(이명과 현기증) 동반될 수 있음이 발생하는 경우, 의사는 타다라필을 포함한 PDE5 저해제의 사용을 중지할 것을 환자에게 권고하고 즉시 의학적인 주의를 기울여야 한다(4, 이상반응 참조).
- 타다라필 5mg 1회 1일 용량은 2년 6개월 이상의 임상시험 경험은 없다.
- 양성 전립선 비대증 치료를 시작하기 전 고려해야 할 다른 비비교적 상태: 양성 전립선 비대증에 대해 타다라필로 치료를 시작하기 전, 유사한 증상을 일으킬 수 있는 다른 비비교적 상태에 대해 고려해야 한다. 추가적으로 전립선암과 양성 전립선 비대증이 함께 동반될 수 있다.
- 운전 및 기계 사용능에 대한 영향
 - 타다라필이 운전 및/또는 기계 사용능에 미치는 영향은 전혀 없거나 무시해도 줄을 것으로 예상된다. 이러한 잠재적인 영향을 평가하기 위한 특이적인 연구는 수행되지 않았다. 임상시험 결과 위약과 타다라필 시험군에서 어지럼증(dizziness)의 발현 빈도가 유사하지만, 환자는 운전이나 기계 조작 전에 본인이 타다라필에 어떻게 반응하는지 인식하고 있어야 한다.

6. 상호작용

○ 타다스테리드

- In vitro 약력 대사 연구에서 두타스테리드는 사람의 CYP3A4에 의해 대사되었으며 CYP3A4 억제제를 투여 중인 환자에서 두타스테리드의 혈중 농도가 증가될 수 있다. 따라서 강력한 CYP3A4 억제제를 만성적으로 복용하는 환자에게 두타스테리드를 투여할 때는 주의해야 한다.
- 두타스테리드는 사람의 항산화제 혈장 농도보다 25배 더 높은 1000ng/mL 농도에서 사람에 비해 CYP450 동종효소(CYP1A2, CYP2A6, CYP2E1, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2B6, CYP2D6)의 기질에 대한 in vitro 대사를 억제하지 않았다. 또한 두타스테리드는 개와 랫드에서의 in vivo 시험에서 CYP P450 동종효소인 CYP1A, CYP2B, CYP3A를 유도하지 않았다.
- 갈슘 채널 길항제 : 2상 임상시험 자료의 약력학적(PK) 분석 결과 CYP3A4 억제제인 베라파필(-37%, n = 6)과 딜티아제(-44%, n = 5)를 병용투여 했을 때 두타스테리드의 클리어런스 감소가 확인되었다. 반대로 CYP3A4 억제제가 아닌 갈슘 채널 길항제인 일란디나(-7%, n = 4)와 두타스테리드를 병용투여했을 때 두타스테리드의 클리어런스 감소는 관찰되지 않았다.
- CYP3A4 억제제(예, 베라파필과 딜티아제)와 병용투여시에 두타스테리드의 클리어런스 감소와 이에 따른 노출량 증가는 두타스테리드의 낮은 안전성(관장용량의 최대 10배)을 최대 6개월간 환자에게 투여한 바 있다.)으로 인해 임상적으로 유의한 것으로 판단되지 않으므로 용량 조정이 권장되지 않는다.
- α -1-아드레날린 차단제 : 건강한 자원자를 대상으로 한 교차시험에서 두타스테리드를 탈스르산 또는 테라조신과 2주 동안 병용투여했을 때 이들 α -1-아드레날린 차단제의 항장상태 약동학은 대 약력학에 영향을 주지 않았다. 병용투여시의 5 α - α -디하이드로테스토스테론(DHT) 농도의 변화율은 두타스테리드 단독투여시와 비슷하였다. 임상시험에서 두타스테리드와 탈스르산을 24주간 병용투여한 후, 12주간 두타스테리드와 탈스르산을 병용투여하거나 두타스테리드를 단독투여하였다. 12주간의 투여기간 후에 두타스테리드 단독투여군과 비교하여 병용투여군에서 고도한 중증 이상반응이 나타나거나 이상반응으로 인한 시험의 중단은 없었다.
- In vitro 시험에서 두타스테리드가 강한 단백질 결합 부위에서 외파린, 다이제팜, 아세노쿠마를, 헤파로쿠론 또는 페티토인을 대체하거나 이들 모델 화합물이 두타스테리드를 대체하지는 않는다.
- 외파린 : 23명의 건강한 피험자에게 두타스테리드 0.5mg/day를 3주 동안 외파린과 병용투여했을 때 S- 또는 R-외파린 이성체의 항장상태 약동학을 변화시키지 않았고 prothrombin time에 대한 외파린의 효과도 변화시키지 않았다.
- 다곡신 : 20명의 건강한 피험자에게 두타스테리드 0.5mg/day를 3주 동안 다곡신과 병용투여했을 때 다곡신의 항장상태 약동학을 변화시키지 않았다.
- 클레스타티린 : 12명의 정상 자원자에게 두타스테리드 5mg 단회투여 한 시간 후에 클레스타티린 12g을 투여했을 때 두타스테리드의 상대적인 생물학적 이용률이 영향을 받지 않았다.
- 기타 병용요법 : 특별히 다른 약물들과 상호작용 시험은 실시하지 않았으나 3상 임상시험에서 두타스테리드를 투여받은 피험자의 약 90%가 다른 약을 병용하고 있다. 임상시험에서 두타스테리드를 항고지질제, 인지오매티신 전환 효소(ACE) 억제제, β -1-아드레날린 차단제, 갈슘 채널 차단제, 코르티코스테로이드, 이노제, 비스테로이드성 항염증제(NSAIDs), phosphodiesterase Type V 억제제 및 퀴놀론계 항생제와 병용투여했을 때 두타스테리드와의 병용투여에 기인한 임상적으로 유익성 없는 부정적인 상호작용은 없었다.

○ 타다라필

1) 타다라필에 대한 다른 약물들의 작용

- 타다라필은 주로 CYP3A4에 의하여 대사된다. CYP3A4의 선택적인 저해제인 케토코나졸(1일 200mg)은 타다라필 단독투여시의 AUC, Cmax 값에 비해, 타다라필(10mg)의 AUC를 2배, Cmax를 15% 증가시켰고, 케토코나졸(1일 400mg)은 타다라필(20mg)의 AUC를 4배, Cmax를 22% 증가시켰다.
- CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6를 저해하는 protease inhibitor인 ritonavir(1일 2회 200mg 투여)는 Cmax의 변화 없이 타다라필(20mg)의 AUC를 2배 증가시켰다.
- 특이적인 상호작용이 연구되지는 않았지만, saquinavir 같은 다른 protease inhibitors, 그리고 erythromycin, clarithromycin, itraconazole 및 grapefruit juice와 같은 다른 CYP3A4 inhibitors는 타다라필의 혈장 농도를 증가시킬 것으로 예상되므로 주의하여 병용투여 되어야 한다. 그 결과로서 4형에 열거한 이상반응의 발생빈도가 증가될 수 있다.
- CYP3A4 유도물질인 리람피산(rifampicin)은, 타다라필 단독투여시(10mg 용량)의 AUC 값에 비해, 타다라필의 AUC를 88% 감소시켰다. 이는 타다라필의 효능을 감소시킬 수 있지만, 그 감소 정도는 알려지지 않았다. 페노바르비탈(phenobarbital), 페니토인(phenytoin), 및 카르바마제핀(carbamazepine)과 같이 다른 CYP3A4 유도물질과의 병용투여 역시 타다라필의 혈장 농도를 감소시킬 수 있음을 예상할 수 있다.
- 타다라필의 분포(disposition)에서 수송자(transporters)의 역할(예를 들면 p-glycoprotein)은 알려지지 않았다. 따라서, 수송자(transporters)의 저해에 의한 약물상호 작용 가능성은 있다.
- 타다라필과 제산제 (수산화기그네솔/수산화알루미늄)의 병용투여시 타다라필의 노출(AUC)에는 변화 없이 흡수율이 명백히 감소되었다.

2) 다른 약물들에 대한 타다라필의 작용

- 임상시험에서, 타다라필(5mg, 10mg과 20mg)은 질산염(nitrates)의 혈압저하 작용을 증가시키는 것으로 나타났다. 따라서, 어떠한 형태의 유기 질산염(organic nitate) 제제라도 정기적 및/또는 간헐적으로 복용하는 환자에게는 타다라필의 투여가 기피(1, 경고 및/또는 다음 환자에게 투여하지 말 것 항 참조). 임상시험 결과에 따르면, 150mg의 환자가 타다라필을 매일 20mg씩 7일 동안 투여하고 0.4mg nitroglycerin 시험정제를 다양한 시간대에 투여하였을 때, 이러한 투여조합은 24시간 이상 지속되었고 타다라필을 마약으로 투여한 후 48시간이 지났을 때 더 이상 나타나지 않았다. 따라서, 타다라필을 투여(타다라필 2.5mg~20mg)한 환자가 생명에 위협을 받는 상황에 처하여 질산염의 투여가 의학적으로 반드시 필요한 경우에는 타다라필을 마약으로 투여한 후 최소한 48시간이 지난 후에야 질산염의 투여를 고려할 수 있다. 그러한 상황에서 질산염을 투여 할때 매우 적절한 혈액 역학적 모니터링(hemodynamic monitoring)과 함께 의사의 세심한 감독이 수행되어야 한다.
- 타다라필은 CYP450 항제에 의해 차단되는 약물의 청소율(clearance)을 임상적으로 유의하게 저해하거나 유도할 것으로 예상되지 않는다. 임상시험 결과 타다라필이 CYP3A4, CYP1A2, CYP2D6, CYP2E1, CYP2C9 및 CYP2C19를 포함하는 CYP450 isoforms를 저해하거나 유도하지는 않는 것이 확인되었다.
- 타다라필(10mg, 20mg)은 S-외파린 또는 R-외파린(CYP2C9 기질)에 대한 노출(AUC)에 있어서 임상적으로 유의한 차이를 나타내지 않았으며, 타다라필은 외파린(warfarin)에 의해 유도된 프로트롬빈 시간(prothrombin time)의 변화에도 영향을 미치지 않았다.
- 타다라필(10mg, 20mg)은 아세틸살리실산(acetyl salicylic acid)에 의한 출혈시간을 증가시키지 않았다.
- 임상약리 시험에서 타다라필이 항고혈압제의 혈압저하 작용을 증가시킬 가능성을 조사하였다. 갈슘통로차단제(am-lodipine), 인지오매티신 전환효소(ACE) 저해제(enalapril), 베타-1-아드레날린성 수용체 차단제(metoprolol), 티아지계 이뇨제(bendrofluzide), 인지오매티신 및 수용체 차단제(다양한 형태 및 용량, 단독 또는 치아지계 이노제(thiazides), 칼슘통로차단제, 베타-차단제, 및/또는 알파-차단제와)의 병용)를 포함하여, 주요 항고혈압제만이 연구되었다. 타다라필(20mg 용량)이 적정된 인지오매티신 수용체 차단제 및 amlodipine에 대한 연구들을 제외한 10mg)은 이 계열의 어떠한 약물과도 임상적으로 유의한 상호작용이 없었다.
- 다른 임상약리 시험에서 타다라필 20mg을 항고혈압 치료제 4종류까지와 함께 병용투여하여 연구하였다. 여러 항고혈압 치료제를 투여한 환자에서 ambulatory blood pressure의 변이는 혈압조절 정도와 관련이 있는 것으로 나타났다. 이와 관련하여, 혈압조제가 잘되지 않는 환자에서는 그 감소가 더 컸다(비록 이러한 혈압감소가 대부분의 환자에게 지혈할 증상과 관련 있지는 않았다). 혈압조제가 잘되고는, 환자에서는 혈압감소가 적었고 건강한 사람에게 나타나는 것과 비슷하였다.
- 항고혈압 약제(antihypertensive medications)를 병용하는 환자들에서, 타다라필 20mg이 혈압 감소를 일으킬 수 있으며, 이것은(알파차단제는 제외, 아래 참조) 일반적으로 중요치 않으며 임상적으로 유의하지 않을 것으로 판단된다. 그 3상 임상시험 자료의 분석 결과, 항고혈압 약제를 타다라필과 병용한 환자군과 항고혈압 약제 없이 타다라필을 복용한 환자군 간에 이상반응에는 차이가 없었다. 그러나, 항고혈압 약제를 병용하는 경우 혈압의 감소가 약제들 간에서 환자들이게 적절한 임상적인 권고(appropriate clinical advice)를 하여야 한다.
- 알파(1)-adrenergic receptor blocker인 독사조신(1일 4mg 또는 8mg)과 타다라필(5mg 1회 1일 용량) 또는 20mg 단회투여를 병용한 환자에서 독사조신의 혈압저하 효과가 유의한 정도로 증가하였다. 이 효과는 투여 후 12시간까지 여전히 나타났으며 기절을 포함한 증상이 나타날 수 있다. 따라서, 타다라필과 독사조신과의 병용은 권장되지 않는다.
- 한정된 인종의 건강한 자원자를 대상으로 한 상호작용 연구에서, 타다라필(10mg, 20mg)과 알부조신(albuzosin) 혹은 선택적인 알파(1A)-adrenergic receptor 차단제인 탈스루산(tamsulosin)의 병용투여시 임상적으로 유의한 혈압변화가 보고되지 않았다. 그러나, 알파 차단제로 치료받고 있는 환자 및 특히 고령자의 경우는 타다라필 사용시에 주의를 기울여야 한다. 치료는 최소용량으로 시작하여 점진적으로 조절되어야 한다.
- 알코올 농도(평균 최대 혈중 농도 0.08%)가 타다라필(10mg 또는 20mg)의 병용투여에 의해 영향받지 않았다. 또한, 알코올을 병용 투여한 후 3시간째에 타다라필 농도의 변화가 나타나지 않았다.
- 알코올은 그 흡수 효과를 최대화하기 위한 방법(하룻밤동안 단식하고 알코올 투여 후 2시간까지 음식물 주지 않음)으로 이루어졌다. 타다라필(20mg)과 알코올을 함께 투여하는 경우 타다라필은 고용량의 알코올(0.7g/kg 또는 80kg 남성에서 40%, 알코올[보드카] 1l 180mL)에 의하여 유도되는 평균 혈압강소를 증가시키지 않아서, 알부 환자에서는 체류성 현기증과 기립성 저혈압이 관찰되었다. 타다라필을 저용량의 알코올(0.6g/kg)과 투여하였을 때, 저혈압은 관찰되지 않았고 현기증은 알코올 단독으로 투여하였을 때와 유사한 빈도로 나타났다. 인식가능에 대한 알코올의 작용은 타다라필(10mg)에 의하여 증가되지 않았다.
- 타다라필은 ethinylestradiol의 경우 생체이용률(bioavailability)을 증가시키는 것으로 나타났다. 임상적인 중요성은 불확실하지만 terbutaline의 경우 투여시 유사한 증가가 예상될 수 있다.
- 임상 약리학 연구에서 타다라필 10mg을 테오필린(theophylline) non-selective phosphodiesterase inhibitor)과 함께 투여했을 때 약동학적 상호작용이 없었다. 유일한 약력학적 작용은 약간의 심박수(3.5 bpm) 증가였다. 동 연구에서 이 작용은 중요하지 않고 임상적인 유익성과 없었지만, 이러한 약물들은 병용투여시에는 이러한 작용을 고려하여야 한다.
- 항당뇨병 약제들의 특이적인 상호작용 연구가 수행되지 않았다.

7. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 이 약은 여성에게 금기이다.
 - 임상시험 결과 두타스테리드에 노출된 여성이 수태한 남자 태아에서 디하이드로테스토스테론(DHT)의 순환 농도의 예외로 인해 외양 생장기 발달이 저해될 수 있음을 시사하였으며, 여성을 대상으로 시험하지는 않았다. 타다라필 1,000mg/kg/일까지 투여한 랫드나 마우스에서 최기형성(teratogenicity), 배자독성(embryotoxicity) 또는 태아독성(fetotoxicity)의 증가가 없었다.
- 이 약은 수유부에게 금기이다.
 - 두타스테리드가 사람의 모유로 이행되는지에 대해서는 알려지지 않았다. 컷트를 대상으로 한 동물실험에서 타다라필 및/또는 그 대사체는 태반을 통과하여 혈중 검출농도에 비해 약 2.4 배 높은 농도로 유즙으로 분비되었다. 임신 여성에서 타다라필 사용에 대하여 연구된 바는 없다.

8. 소아에 대한 투여

이 약은 18세 미만의 소아에게 사용할 수 없다. 18세 미만의 소아에 대한 안전성과 유효성은 확립된 바 없다.

9. 고령자에 대한 투여

○ 타다스테리드

양성 전립선 비대증에 대한 세 가지 임상시험에서 두타스테리드를 투여한 2,167명의 피험자 중에서 60%가 65세 이상이었고 15%가 75세 이상이었다. 이들 피험자와 더 젊은 피험자 사이에서 안전성은 유효성은 차이가 관찰되지 않았다. 기타 임상시험에서도 고령자와 젊은 환자 간에 반응 상 차이가 보고되지 않았다.

10. 임상검사치에의 영향

○ 두타스테리드

- PSA에 미치는 영향: 두타스테리드를 투여한 환자에서 전립선 부피가 감소하므로 PSA값도 일반적으로 감소한다. 피험자의 약 1/2에서 투여 1개월 이내에 PSA값이 20% 감소하였다. 투여 6개월 후에는 PSA값이 투여 전 수치의 약 50% 정도인 새로운 초기값으로 안정화되었다. 두타스테리드를 최대 2년 동안 투여한 피험자에서의 결과를 통해서 PSA값의 50%까지 감소가 지속되었다. 따라서 두타스테리드 투여 후 3~6개월에는 PSA 초기값을 다시 설정해야 한다.
- 호르몬 수치: 건강한 자원자에서, 위약(n = 23)을 투여했을 때와 비교하여 두타스테리드 0.5mg/day(n = 26)를 52주간 투여했을 때 globulin 결합 성호르몬, estradiol, 황체 형성 호르몬, 여포 자극 호르몬, thyroxine(free T4), dehydroandrosterone의 수치가 임상적으로 유익성 있게 변하지 않았다. 8주째 총 testosterone(97.1ng/dL, p(0.003)과 52주째 갑상선 자극 호르몬(TSH) (0.4mclU/mL, p(0.05) 수치가 위약과 비교하여 통계적으로 유익성 있게 증가하였다. 두타스테리드 투여군 내에서 초기값으로부터 변화율의 중앙값은 testosterone의 경우 8주째 17.9%, TSH의 경우 52주째 12.4%였다. 검사 시마다 자료가 유용했던 피험자에서의 testosterone과 TSH의 평균값이 투여 중단 후 24주간의 추적기간에 초기값 수준으로 회복되었다. 양성 전립선 비대증 환자에게 두타스테리드를 투여한 대규모의 3상 임상시험에서, 황체 형성 호르몬 증가율의 중앙값이 6개월째에는 12%, 12, 24개월째에는 19%였다.

11. 과량투여시의 처리

○ 타다스테리드

지원자 시험에서, 두타스테리드를 최대 40mg/24시간(성용량의 80배)까지 안전성에 대한 특별한 염려 없이 7일간 1 일 1회 투여하였다. 임상시험에서는 피험자 60명에게 두타스테리드를 1일 5mg씩(치료용량의 10배) 6개월간 투여하였으며, 0.5mg을 투여했을 때와 비교하여 추가적으로 나타낸 이상반응은 없었다. 두타스테리드에 대한 특별한 해독제는 없으므로, 과량투여에 의한 증상이 의식될 때로는 두타스테리드의 반감기가 더 긴 것을 고려하여 적절한 보조요법을 실시하여야 한다.

○ 타다라필

- 건강한 피험자들에게 최고 500mg까지의 용량을 1회 투여한 적이 있고, 환자들에게 최고 100mg까지의 1일 투여량을 여러 번 투여한 적이 있다. 이상반응은 저장량에서 발견된 것과 유사하였다.
- 과량투여의 경우에는 필요시 표준 보조요법(standard supportive measures)을 실시한다. 혈액투석은 타다라필 배설에 거의 영향을 미치지 않는다.

12. 보관 및 취급상의 주의사항

- 아연의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 안전이인이 되거나 품질 유지면에 비바람직하지 않으므로 원래 포장 상태로 보관한다.

13. 전문가를 위한 정보

1) 약력기전

- 작용기전
 - 이 약은 이중 5 α -환원효소 억제제(5-ARI)인 두타스테리드와 PDE5 저해제인 타다라필 두 가지 약물의 복합체로, 양성 전립선 비대증(BPH) 환자의 증상을 개선시키는 상보적 작용기전을 가진다. 두타스테리드는 테스토스테론이 5 α -디하이드로테스토스테론(DHT)으로 전환되는 것을 담당하는 1 α 형 및 제 2형의 5 α -환원효소 동종효소를 둘 다 억제한다. DHT는 전립선 조직 변화의 주요 원인이 되는 엔드로겐이다. 타다라필은 cGMP-특이적인 phosphodiesterase type 5 (PDE5)에 대하여 선택적, 가역적 억제제이다.
- 약력학적 정보
 - 두타스테리드
 - 두타스테리드는 DHT 수치를 낮추고, 전립선 부피를 감소시키며, 하부요로 증상과 요류를 개선하며, AUR 및 BPH 관련 수술의 위험성을 감소시킨다.
 - 타다라필
 - 타다라필은 cyclic guanosine monophosphate(cGMP)-특이적인 PDE5에 대하여 선택적, 가역적 저해제이다. 성적 자극(sexual stimulation)이 고혈압을 감소시키는 상보적 작용기전과 일치할 때, 타다라필에 의한 PDE5의 억제자 해면체(corpus cavernosum)에서 cGMP의 수치를 증가시킨다. 이질 때, 평활근 이완(smooth muscle relaxation)과 음근 조직에서의 혈액 유입을 가져오므로 발기(erection)를 일으킨다. 타다라필은 성적 자극이 없는 경우에는 효력이 없다.

음경 해면체와 패동맥에서의 cGMP농도에 대한 PDE5 저해효과가 전립선, 방광 및 이들에게 공급되는 혈관의 평활근에서서 관찰되었다. 양성 전립선 비대증의 증상을 완화하는 작용기전은 밝혀지지 않았다. In vitro 시험에 결과, 타다라필은 PDE5의 선택적인 저해제이다. PDE5는 해면체 평활근, 전립선 및 방광 및 배관 및 내장 혈관(vascular and visceral smooth muscle), 골격근, 혈소판, 신장, 패 및 소뇌(cerebellum)에서 발견되는 효소이다. 타다라필의 효과는 다른 phosphodiesterases보다 PDE5에 대하여 더 큰 효능이 있다. 타다라필은 심장, 뇌, 혈관, 간과 다른 기관에서 발견되는 효소인 PDE1, PDE2, PDE4 보다는 PDE5에 대하여 10,000배를 초과하는 더 큰 효능이 있다. PDE3가 신 수축성 단백질(contractility)에 관여하는 효소이므로, PDE3보다 PDE5에 대한 이러한 선택성은 중요하다. 또한 타다라필은, 망막(retina)에서 발견되는 효소이자 포토신분산을 담당하는 PDE6보다 PDE5에 대하여 약 700배 더 효능이 있다. 타다라필은 또한 PDE7 ~PDE10보다 PDE5에 대하여 10,000배를 초과하는 더 큰 효능이 있다. 건강한 피험자들에게 이 약을 투여했을 때, 양자물(supine) 심장수축기 및 이완기혈압(systolic) 및 이완기(diastolic) 혈압 각각 1,6/0.8 mmHg의 평균 최대 감소), 약 2배 더 심상수축기 및 이완기혈압 각각 0.2/4.4 mmHg의 평균 최대 감소의 측면에서 위약과 비교하여 유의한 차이가 없었으며 심박수 감소에 있어서도 유의한 차이가 없었다. 시점에 대한 타다라필의 작용을 평가하기 위한 연구에서, Farnsworth-Munsell 100-hue test를 사용했을 때, 색 식별(청색/녹색)의 장애가 검출되지 않았다. 이러한 결과는 PDE5와 비교할 때 PDE6에 대한 타다라필의 낮은

친화력과 일치한다. 모든 임상 시험에 걸쳐, color vision의 변화에 대한 보고는 드물었다(0.1 %).

타다라필의 정자형성(spermatogenesis)에 대한 잠재적인 영향을 평가하기 위해, 본 약물 10mg을 6개월 간 매일 복용하거나, 20mg을 각각 6개월 또는 9개월 간 매일 복용한 남성들에서 3가지 임상연구들이 실시되었다. 이 중 2 개의 연구에서 타다라필의 치료와 관련하여 임상적 다양성은 없어 보이는 정자 숫자와 농도의 감소가 관찰되었다. 정자 운동성, 형태, 난포자극호르몬(follicle stimulating hormone)의 다른 척도들의 변화는 관찰되지 않았다(1.경고 항 참조).

2) 약동학적 정보

(1) 두타스테리드/타다라필 복합제

이 약과 각각의 단일제의 병용투여 시 약동학적 특성 및 안전성을 비교평가하기 위해 건강한 남성을 대상으로 무작위 배정, 공개, 단회, 2치로, 2순서군, 271, 교차시험으로 수행하였다. 약동학 평가 대상자는 40명으로 두타스테리드(Dutasteride) 및 타다라필(Tadalafil)의 AUClast, Cmax모두 기하 평균비의 90% 신뢰구간이 약리학 동등성 평가 기준인 80.00~125.00%에 포함되어 이 약과 대조와 두타스테리드 0.5mg과 타다라필 5mg의 병용투여가 생물학적으로 동등한 것으로 확인되었다.

(2) 타다라필

① 흡수

타다라필은 경구투여 후 신속히 흡수되며 관찰된 평균 최대 혈장 농도(Cmax)는 투여 후 중간값으로 2 시간에 도달하였다. 경구투여 후 타다라필의 절대 생체이용률은 결정되지 않았다. 타다라필의 흡수율과 흡수 속도는 식사에 의해 영향받지 않으므로 타다라필은 식사와 함께 또는 식사를 하지 않고 복용할 수 있다. 복용 시간(아침 대 저녁)은 흡수율과 흡수정도에 대하여 임상적으로 연상성 있는 경우 없었다.

② 분포

평균 분포용적이 약 63 L이며, 이는 타다라필이 조직에 분포됨을 나타낸다. 치료 농도에서 혈청에 있는 타다라필의 94%가 단백백질에 결합한다. 단백백질 결합은 신기능 장애에 의하여 영향 받지 않는다. 투여 용량의 0.0005% 미만인 건강한 피험자의 정액(semen)에서 발견되었다.

③ 생체전환(Biotransformation)

타다라필은 사이토크롬 P450(CYP) 3A4 isoform에 의하여 주로 대사된다. 주요 순환 대사산물은 메틸가테콜 글루쿠로나이드(methylcatechol glucuronide)이다. 이 대사산물은 PDE5에 대하여 타다라필보다 최소 13,000배 더 적은 효능이 있다. 따라서, 적절한 대사산물 농도에서 임상적으로 활성이 없다고 예상되지 않는다.

④ 배설

건강한 피험자들에서 타다라필의 평균 경구 청소율(clearance)은 2.5L/시간이고 평균 반감기는 17.5 시간이었다. 타다라필은 불활성화 대사산물로 유력하게 배설되며, 주로 대변(투여량의 약 61 %)과 뇨에서는 다 소량(투여량의 약 36%)이 배설된다.

⑤ 선형성/비-선형성(linearity/non-linearity)
건강한 피험자들에서 타다라필의 약동학은 시간과 투여량에 대하여 선형적(linear)이다. 2.5–20mg의 투여량 범위에서, 노출(exposure : AUC)이 투여량과 비례하여 증가한다. 1일 1회 투여한 경우 5일 이내에 steady-state plasma concentrations에 도달한다.

〈특수 집단〉

① 고령자

건강한 고령 피험자들(65세 이상)은 19세~45세의 건강한 피험자에 비하여, 타다라필의 경구 청소율이 더 낮았으며 이는 25% 더 높은 노출(exposure : AUC)을 가져 왔다. 이러한 연령의 효과는 임상적으로 유의하지 않으며 용량 조절(dose adjustment)을 정당화하지 않는다.

② 신기능 부전증

경증(크레아티닌 청소율 51–80mL/분) 또는 중증도(크레아티닌 청소율 31–50mL/분)의 신장애를 가진 피험자 및 투석을 하는 말기 신부전 피험자들에게 타다라필 1회 용량(5–20mg)을 사용한 임상약리 시험군(두타스테리드와 타다라필 복합제)이 -9.49(±0.37)점, 대조군 1(두타스테리드)이 -4.40(±0.37)점이었으며, LS Mean Difference(95% CI)는 -5.09(-6.13, -4.05)점으로 군간 차이가 통계적으로 유의하여(p-value(0.0001) 대조군 1(두타스테리드) 대비 시험군의 우월성을 입증하였다. 베이스라인 대비 48주 시험 Total IPSS 변화량의 LS mean(±SE)은 시험군이 -9.53(±0.36)점, 대조군 2(타다라필)가 -4.24(±0.37)점이었으며, LS Mean Difference(95% CI)는 -5.29(-6.30, -4.27)점으로 군간 차이가 통계적으로 유의하여(p-value(0.0001) 대조군 2(타다라필) 대비 시험군의 우월성을 입증하였다. 결론적으로 베이스라인 대비 48주 시험 Total IPSS 변화량에 대한 각 대조군 대비 시험군의 우월성을 모두 입증하였다.

4) 독성시험 정보

(1) 두타스테리드

① 유전독성

두타스테리드는 다양한 in vitro와 in vivo 시험에서 유전독성을 나타내지 않았다. 박테리아 돌연변이원성 시험(Ames test), CHO 세포에서 염색체 이상시험, 그리고 랫드에서의 소핵시험을 통해 두타스테리드의 유전독성을 시험한 결과, 두타스테리드의 유전독성 가능성은 나타나지 않았다. 시험에서의 2가지 주요 대사체도 Ames test 또는 변형 Ames test에서 돌연변이원성이 없었다.

② 발암성

B6C3F1 마우스에 대한 2년간의 발암성 시험에서, 수컷에게 두타스테리드 3, 35, 250, 500mg/kg/day 용량을, 암컷에게 두타스테리드 3, 35, 250mg/kg/day 용량을 투여하였다. 250mg/kg/day(1일 0.5mg 투여 시 예상 임상 노출량의 290배)를 투여한 암컷에서만 양성 간세포 선종 발생 증가를 확인하였다. 시험에서의 주요 대사체 3개 중 2개를 마우스에서 확인하였다. 마우스에서의 이들 대사체 노출량이 사람에게보다 더 높았지는 알려지지 않았다. Han Wistar 랫드에 대한 2년간의 발암성 시험에서, 수컷에게 두타스테리드 1.5, 7.5, 53mg/kg/day 용량을, 암컷에게 두타스테리드 0.8, 6.3, 15mg/kg/day 용량을 투여했을 때 53mg/kg/day(예상 임상 노출량의 135배)를 투여했을 때 고환에서 Leydig 세포 선종이 증가하였다. 수컷에게 7.5mg/kg/day(예상 임상 노출량의 52배) 및 53mg/kg/day를 투여했을 때 Leydig 세포 과형성 발생률 증가가 나타났다. Leydig 세포의 증식 변화와 순환 황체 형성 호르몬의 증가 간에 양의 상관관계가 5 α -환원효소 투여로 증명되었고 이것은 5 α -환원효소 억제 후 시상하부-뇌하수체-고환 축에 미치는 영향과 일치하였다. 랫드의 발암 용량에서, 랫드의 황체 형성 호르몬 수치가 167%까지 증가하였다. 이 시험에서 임상 노출량의 약 1 ~3배에 노출되었을 때 시험에서의 주요 대사체의 발암성에 대해서 시험하였다.

랫드에 대한 발암성 시험에서 고용량(임상 노출량의 158배) 투여시 양성 간질세포 종양이 증가하였다. 그러나 랫드에서의 간질세포 비대와 선종에 연관된 것으로 고려되는 내분비 거친은 시험하는 편이 없다. 마우스에 노출되었을 때 양성 종양에 대한 프로파일에 중형 프로파일에 연관된 영향은 나타나지 않았다.

생식발달독성

성적으로 성숙한 수컷 랫드에게 두타스테리드 0.05, 10, 50, 500mg/kg/day(모체 약물의 예상 임상 노출량의 0.1 ~110배를 31주까지 투여했을 때 생식능이 용량과 시간에 의존하여 감소하였고, 부고환의 정자 수가 감소하였으나 정자 농도는 감소하지 않았고(50, 500mg/kg/day), 부고환, 전립선, 전액낭 무게가 감소하였고 수컷의 생식기관에서는 현미경적 변화가 나타났다. 모든 두타스테리드 투여군에서 회복기(6주)에 생식능은 회복되었고 수컷 수컷 회복기 14주 말에 정상으로 되었다. 5 α -환원효소 관련 변화에는 부고환의 광조직세포의 세포질 공포화, 상피세포의 세포질 내용물 감소 등이 있었고 전립선과 정액낭에서 분비 혈장 감소와 일치하였다. 저용량(대조군 회복기 14주째에 현미경적 변화가 더 이상 나타나지 않았고 나머지 투여군에서도 부분적으로 회복되었다. 29 ~30 주까지 두타스테리드 10, 50 또는 500mg/kg/day를 투여한 수컷과 시험동물을 투여하지 않은 암컷을 교배시켰을 때 암컷의 황체에서 두타스테리드가 저농도(0.6 ~17ng/mL)로 검출되었다. 두타스테리드에서 수컷 랫드에서 수태율의 가역적 감소를 유발하였던 이 이는 부족 생식기관에 대한 5 α -환원효소 억제의 약리활성과 일치하는 것이다. 이러한 영향은 정자 발생, 농도, 운동성에 대한 영향이 없었으므로 임상적 유익성은 없는 것으로 고려된다.

암컷 랫드에 대한 배태자 발달 시험에서 두타스테리드 0.05, 2.5, 12.5, 30mg/kg/day를 병용투여했을 때 모든 용량(임상에서 남성에게 노출되는 양의 0.07~111배로 예상)에서 수컷 태자(행문 성기 거리 감소)와 수컷 신생자의 여성화(유두 발달, 요도하열, 포피신 팽창)가 나타났다. 체중감소와 관련하여 출하 기간과 관련된 골격근 변형 발생률 증가를 12.5, 30mg/kg/day(예상 임상 노출량의 56~111배) 용량에서 관찰되었다. 또한, 두타스테리드 2.5mg/kg/day(시험에서 모체 약물의 예상 임상 노출량의 2~10배) 이상 용량에서 한배배치/수컷 수컷에 노출되었을 때, 태자 흡수와 수컷 태자의 여성화가 증가하였다. 태자 체중도 두타스테리드 0.05mg/kg/day(사람에서의 노출량의 0.02배 미만) 이상 용량에서 감소하였다.

랫드에게 경구투여한 출생 전후 시험에서 두타스테리드를 0.05, 2.5, 12.5, 30mg/kg/day 용량으로 투여하였다. F1 세대 수컷 신생자 생식기의 여성화(행문 생기의 거리 감소, 요도하열 증가, 유두 발달)가 0.5mg/kg/day(남성에서의 예상