

일반의약품

수정
횟수

04

수정일

2025. 03. 31

제품명

벤티메가나이스정

분류

설명서

규격(mm)

125×173

후가공

수정코드

-

COLOR

1도

특이사항

※ 반드시 수정일 경우 수정코드 적용바랍니다.
EX) OTC/ETC(P2301), 건식(IFY2301)
※ 문의사항 : 02)570-3844(홍보팀)

일양약품

서울특별시 강남구 도곡로 194

디자인사양은 반드시 좌측상단에 배치바랍니다.

설명서

125 × 173

활성비타민 함유 고효량 기능성 비타민

벤티메가 나이스정

Nice

일반의약품

【원료약품 및 그 분량】 1정(887밀리그램) 중

유효성분

벤포티아민(KP)	100mg	셀레늄함유건조효모(KP)	25mg
(티아민염산염(으)로서 72.31mg)		(셀레늄(으)로서 13.5μg)	
산화마그네슘(KP)	30mg	우르소데옥시콜산(KP)	10mg
(마그네슘(으)로서 18mg)		아스코르브산(KP)	100mg
토코페롤아세테이트 2배산(KP)	40mg	폴산(KP)	0.5mg
(비타민E(으)로서 20 I.U.)		D-비오틴(USP)	0.5mg
산화아연(KP)	20mg	메코발라민(KP)	1000μg
(아연(으)로서 16mg)		이노시톨(KP)	30mg
콜레칼시페롤농축분말(EP)	10mg	니코틴아미드(KP)	100mg
(비타민D로서 1,000 I.U.)		판토텐산칼슘(KP)	100mg
리보플라빈부타레이트(KP)	12mg	감마-오리자놀(KP)	5mg
피리독살포스페이트수화물(KP)	5mg	유비쿼테론(KP)	5mg

첨가제 : 스테아르산마그네슘, 미결정셀룰로오스, 크로스포비돈, 히드록시프로필셀룰로오스, 경질무수규산, 탈실드칼슘(29B1033)

【성상】 갈색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】

1. 다음 경우의 비타민 D, E, B₆, B₁₂, C의 보급

- 육체 피로 - 임신·수유기 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시
- 발육기 - 노년기

2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.

- 뼈, 이의 발육발달 - 구루병의 예방
- 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

- 각기 - 눈의 피로

3. 아연의 보급

【용법·용량】 만 12세 이상 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(saroidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장(콩팥)질환 환자
- 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 만 12개월 미만의 영아
- 신장(콩팥)결석 환자
- 심한 증상의 신부전 환자
- 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 인산염, 칼슘염, 경구(먹는, 복용하는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살염이 배설되는 상태)
- 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
- 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자

- 심장·순환 기계기능 장애 환자
- 신장(콩팥) 장애 환자
- 저단백혈증 환자
- 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자
- 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자
- 임부
- 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 해당염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부 문서를 소지할 것.

- 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 :구역, 구토, 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 붉은 변, 식욕부진, 복부(배부분) 팽만감, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 피부염, 땀 호흡 시 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부(배부분)통증, 저혈압, 폐부종(부기)
- 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 영이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
- 에스트로겐을 포함한 경구(먹는, 복용하는)용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민D를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있다.
- 장기간 고효량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- 피리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각 신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
- 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
- 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용(사용))투여 시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
- 우발적으로 과량복용 한 경우
- 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것
- 각종 요검사 시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- 요를 황색으로 변하게 하여 임상 검사치 에 영향을 줄 수 있다.
- 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용 전, 후에는 피할 것.

6. 일반적 주의

- 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장 지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외 배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 존재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질 제의 투여량을 감소해야 한다.

7. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
- 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【포장단위】 60정/병, 120정/상자(60정/병x2)

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관 【설명서 개정연월일 / 관리번호】 2025,04,01 / P2504-1

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 제품은 약국개설자 또는 의약품판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 "소비자분쟁해결기준"에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상해드립니다.
- ※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어와야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 최종 개정연월일(2025, 04, 01)이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품 통합정보시스템 (https://nedrug.mfds.go.kr)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 의약품 부작용 신고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223 혹은 14-33330)

【제조회자】

(주)한국글로벌제약

충남 서천군 중천면 충천공단길 32번길 26

【제조자】

Medix 메디스제약

전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단6로 170

【판매자】

일양약품주식회사

경기도 용인시 기흥구 하갈로 110

소비자상담실 : 080-021-1010(주·산자요구부담당해)

홈페이지 www.ykyang.co.kr

재단선