



PANTONE 165 C



PANTONE 485 C



심블(초록)

로고타입(검정)

PANTONE
7739C

K 100

1P

일반 의약품
분류번호:03190

엔피비타비정
NP Vita-B Tab.

60정

조제용

【원료약품 및 분량】 1정 중 · 유효성분 : 벤포티아민(KP) 50mg(티아민염산염으로서 36.16mg), 피리독신염산염(KP) 50mg, 폴산(USP) 0.25mg, 시아노코발라민(KP) 0.2mg · 첨가제(타르색소) : 황색4호, 적색40호 · 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유) · 기타 첨가제 : 히드록시프로필셀룰로오스, 미결정셀룰로오스, 크로스 카멜로오나트륨, 이산화규소, 스테아르산마그네슘, 히프로멜로오스, 폴리에틸렌 글리콜6000, 산화티탄, 탈크 **【성상】** 연한 주황색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】 **【용법·용량】** **【사용상의 주의사항】** 라벨 뒷면 참조

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30°C)보관

【제조회사】 대한뉴팜(주) / 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 66

【제조사】 (주)노바엠엘스케어 / 경상북도 경산시 하양읍 지식산업4로 16-53

30x18mm

3002000-000

【제조번호】
【사용기한】

HDPE 뚜껑, LDPE

8 806699 085418

뒷면 참고

【효능·효과】 ○ 다음 경우의 비타민 B₁, B₆의 보급 - 육체피로 - 임신 · 수유기 - 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시 - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다. - 비타민B₁(벤포티아민) · 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등) · 각기 · 눈의 피로 - 비타민 B₆(피리독신염산염) · 다음 증상의 완화 : 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

【용법·용량】 만 12세 이상 및 성인 : 1일 2회, 1회 1정 복용 또는 1일 1회, 1회 2정 복용

【사용상의 주의사항】 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 2) 만 3개월 미만의 젖먹이 3) 이 약을 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. 레보도파

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것. 이 약은 황색4호(타르트린)를 함유하고 있으므로 이 성분은

과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다. 4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 1) 만 1세 미만의 젖먹이 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자 5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 묽은 변 2) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경 병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다. 3) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다. 4) 우발적으로 과량복용 한 경우 5) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우 6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것. 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 · 감독하에 투여할 것. 7. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【포장단위】 60정/병

【사용기간】 제조일로부터 36개월

* 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 유효기한 또는 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국, 병원, 도매상을 통하여 교환하여 드립니다. 기타 자세한 문의사항은 당사 학술개발팀으로 문의하여 주시기 바랍니다 (전화 : 031-778-2600).

* 자세한 품목허가 또는 신고사항은 의약품안전나라([https:// nedrug.mfds.go.kr](https://nedrug.mfds.go.kr))를 통하여 확인하시기 바랍니다.

* 의약품 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원에 피해구제를 신청할 수 있습니다.

* 작성년월일 : 2025. 02. 24
3002000-000

제조의뢰자

대한뉴팜

제조사

NOVA M
Healthcare

접착면