PANTONE 2727 C

PANTONE 485 C

심볼(초록) PANTONE 7739C

로고타입(검정) K 100

150 mm

33 mm

1P

일 반 의 약 품

분류번호:03190

조제용

엔피셀렌씨정

NP Selen-C Tab.

60정

【원료약품 및 분량】 1정 중 · **유효성분 :** 셀레늄함유건조효모(KP) 66.660mg(셀레늄으로서 100μg), 아스코르브산(KP) 50.000mg, 산화아연(KP) 31.110mg(아연으로서 25.0mg), 크롬함유건조효모(KP) 12.500mg(크롬으로서 25μg), 황산망간수화물(USP) 3.070mg(망간으로서 1.0mg) · **첨가제(타르색소) :** 청색2호알루미늄레이크 · **첨가제(동물유래성분) :** 유당수화물(소, 우유) · **기타 첨가제 :** 히드록시프로필셀룰로오스, 미결정셀룰로오스, 크로스카멜로오스나트륨, 이산화규소, 스테아르산마그네슘, 히프로멜로오스, 폴리에틸렌글리콜6000, 탤크, 산화티탄 **【성상】** 연한 파란색의 원형 필름코팅정 **【효능 · 효과】 【용법 · 용량】 【사용상의 주의사항】** 라벨 뒷면 참조
【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30°C)보관
【제조의뢰자】 대한뉴팜㈜ / 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 66
【제조자】 ㈜노바엠헬스케어 / 경상북도 경산시 하양읍 지식산업4로 16-53

6751900-000

【제조번호】
【사용기한】

30x18mm

플라스틱 HDPE 뚜껑:LDPE

8 806699 085517

뒷면 참고

접 착 면

【효능 · 효과】 ○ 다음 경우의 비타민 C의 보급 - 육체피로 - 임신 · 수유기 - 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시 ○ 아연의 보급 ○ 셀레늄의 보급
【용법 · 용량】 만 12세 이상 및 성인 : 1일 2회, 1회 1정 복용 또는 1일 1회, 1회 2정 복용
【사용상의 주의사항】 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 2) 만 12개월 미만의 젖먹이 3) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose mal absorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다. **2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.** 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제 **3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.** 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태) 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자 5) 심장 · 순환기계 기능 장애 환자 6) 신장장애 환자 7) 저단백혈증 환자 8) 담낭(쓸개)관련 질환, 간질환 환자 9) 당뇨병 환자 10) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자 **4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.** 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 설사, 피부염, 땀 · 호흡시 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종 2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다. 3) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다. 4) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것. 5) 우발적으로 과량복용 한 경우 6) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우 **5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항** 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것. 2) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다. 3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것. **6. 저장상의 주의사항** 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

접 착 면

【포장단위】 60정/병
【사용기간】 제조일로부터 36개월
※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 유효기한 또는 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국, 병의원, 도매상을 통하여 교환하여 드립니다. 기타 자세한 문의사항은 당사 학술개발팀으로 문의하여 주시기 바랍니다 (전화 : 031-778-2600).
※ 자세한 품목허가 또는 신고사항은 의약품안전나라(https:// nedrug.mfds.go.kr)를 통하여 확인하시기 바랍니다.
※ 의약품 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원에 피해구제를 신청할 수 있습니다.

※ 작성년월일 : 2025. 02. 24
6751900-000

제조의뢰자 대한뉴팜

제조자 NOVA MW Healthcare