

품명	아이엑티브연질캡슐 설명서
규격	125 x 160mm
형식	-
코팅	-
재질	모조지 70g
인쇄도수	1도
폰트	제작서체 / 나눔스퀘어
수정이력	2025.03.14_신규

125*160



코드리버오일이 함유된

아이엑티브
연질캡슐



[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

- 유효성분
간유(USP) 500mg (비타민A(으)로서 500 I.U.) [동물유래 : 간유(기원동물 : 대구, 사용부위 : 간)]
콘드로이틴설페이트나트륨(KP) 25mg
티아민질산염(KP) 10mg
리보플라빈(KP) 5mg
토코페롤아세테이트(KP) 25mg (비타민E(으)로서 25 I.U.)
■첨가제(동물유래) : 백납(기원동물 : 벌, 사용부위 : 벌집), 숙신산젤라틴(기원동물 : 소, 사용부위 : 가죽)
■기타 첨가제 : 경화유, 농글리세린, 레시틴, 산화티탄, 소르비톨 액(비결정성), 에틸비닐린, 치자청색소

[성상] 주황색의 내용물을 함유한 청색의 타원형 연질캡슐제(ICT)

[효능·효과]

- 다음 경우의 비타민 A, E, B1, B2의 보급
- 육체피로 - 임신·수유기 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시 - 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
· 비타민A(간유) : 눈의 건조감의 완화 · 야맹증(밤에 잘 못보는 증상) · 비타민E(토코페롤아세테이트) : 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움) · 비타민B1(티아민질산염) : 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등) · 각기 · 눈의 피로
· 비타민B2(리보플라빈) : 다음 증상의 완화 : 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진 피부염

[용법·용량]

만 8세 이상 및 성인 : 1일 2회, 1회 2캡슐 복용

[사용상의주의사항]

- 1. 경고
1) 임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 말 것(비타민 A 결핍증 환자는 제외).
- 2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
2) 만 3개월 미만의 젖먹이
3) 대두유(콩기름)에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
1) 만 1세 미만의 젖먹이
2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
① 외국에서 임신 전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현(기형발생) 증가가 추정된다는 역학 조사 결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A 결핍증 치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 요한다.
4) 고지단백혈증, 당뇨병성고지혈증 및 체장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우

- : 구역, 구토, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종(부기), 위부(상복부)불쾌감, 묽은 변, 변비, 설사, 식욕부진, 홍반(붉은 반점), 두드러기, 습진, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 반구진성 발진, 가려움, 부종(부기), 부종(부기)·수분저류(고임)(신부전 또는 심부전 환자)
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
- 3) 에스트로겐을 포함한 경구(먹는)용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있다.
- 4) 장기간 고용량의 비타민 A(베타카로틴으로부터 전환된 것을 제외한) 섭취는 폐경기를 지난 여성의 골다공증(뼈영양성증) 위험을 높일 수 있다.
- 5) 우발적으로 과량복용한 경우
- 6) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 투여할 것.
 - 3) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 IU 이상을 넘지 않도록 한다.
 - 4) 요를 황색(노란색)으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
 - 5) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.
6. 저장상의 주의사항
- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 120 캡슐/상자((10캡슐/PTP)×12)

[사용(유효)기한] 제조일로부터 36개월(케이스 표시일까지)

[제조의뢰·판매자] 태극제약(주) 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 123

[제조자] (주)서흥 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61

[소비자상담전화] 080-300-8282

- ※ 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용(유효)기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 복용(사용)하지 마십시오.
- ※ 이 약을 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.
- ※ 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(http://www.taiguk.co.kr) 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(https://nedrug.mfds.go.kr) 및 QR코드를 참조하십시오.

의약품 사용 후 부작용 발생 시, 부작용 신고 및 피해구제 신청은 한국의약품안전관리원에 할 수 있습니다.

신청방법 ☎ 1644-6223, 14-3330 | ☐karp.drugsafe.or.kr

신청대상 의약품 부작용으로 사망, 장애, 질병 피해를 입은 환자 및 유족

보상범위 사망일시보상금, 장례비, 장애일시보상금, 진료비

첨부문서 작성 연월일 : 2025. 03. 14

제조의뢰·판매자
태극제약(주)

제조사
서흥