

코시원큐캡슐_설명서

- 사이즈 : 120 x 160 mm
- 재질 : 모조지 70g
- 사양 :양면인쇄(1도)

자재명	코시원큐캡슐_설명서			
관리번호	2B452N2502	작성자	남주리	
검토	검토	확인	확인	승인

요청일자	전달일자	내용
11.06	11.12	1차 전달
25/2.14	2.18	2차 (관리번호 추가, 함량 및 문안 수정)
2.20	2.21	3차 (문안수정)
2.24	3.06	4차 (문안수정)



【성분·함량】1캡슐 중
■ 유효성분 : 글리시리진산이칼륨(KP) 21.85mg
(글리시리진산으로서 20mg)
메퀴타진(KP) 1.33mg
벨라돈나총알카로이드(JP) 0.13mg
(총 알카로이드(O)로서 0.13mg)
슈도에페드린염산염(KP) 30mg
카페인무수물(KP) 50mg

■ 첨가제(타르색소) : 적색3호, 황색5호, 황색203호
■ 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 캡슐, 콜로이드성이산화규소

【성상】 흰색 또는 미황색의 과립이 들어있는 상부 주황색, 하부 미황색의 경질캡슐제

【효능·효과】 코감기(급성비염), 알레르기성 비염 또는 부비동염에 의한 다음 증상의 완화
: 코막힘, 콧물, 재채기, 눈물, 인후통, 머리 무거움

【용법·용량】 만 15세 이상 및 성인 : 1회 1캡슐, 1일 3회 매 식후 복용하고 복용간격은 4시간 이상으로 합니다.

【사용상의 주의사항】

- 경고
슈도에페드린 함유 제제 복용 시 급성 전신성 발진성 농포증(AGEP)과 같은 중증 피부 이상반응이 나타날 수 있습니다. 발열, 홍반, 다수의 작은 농포와 같은 증상이 관찰될 경우 이 약의 복용을 중단하고 의사 또는 약사와 상의해야 합니다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
1) 만 3개월 미만의 영아 2) 만 15세 미만의 소아 3) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람 4) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람 5) 중증 또는 조절되지 않는 고혈압 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 마십시오.
다른 비염(코염)용 경구제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(감기약, 진해(기침을 그치게함)거담제(가래약), 열미약, 알레르기용약 등)
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
3) 고혈압, 심장질환, 신장질환, 부종(부기), 복내장(예: 눈의 통증, 눈이 점점함 등), 배뇨(소변을 누)곤란 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
4) 경자(노인)
5) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
6) 다음과 같은 기침이 있는 사람
흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

- 7) 슈도에페드린 성분과 관련하여 허혈성 대장염의 증상(급격한 복통, 직장 출혈 등)이 발현될 경우
- 8) 감기약, 진해거담제, 비염용 내복약 등으로 불면증, 현기증, 약점, 떨림, 심장의 고동을 일으킨 적이 있는 사람

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

상당시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
출혈성뇌졸중, 구역·구토, 목마름(지속적이거나 심한), 변비, 식욕부진, 발진·발적(출혈되어붉어짐), 가려움, 배뇨(소변을 누)곤란, 두통, 안면홍조, 비정상적인 눈부심
- 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증 증상이 나타난 경우
① 속(아나필락시스) : 복용후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있습니다.
② 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등이 나타날 수 있습니다.(1일 최대 복용량이 감초로서1g이상의 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임, 붓임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관혈(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지하십시오.)
③ 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관혈을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지하십시오.
④ 가역적 후뇌 병증 증후군 및 가역적 뇌혈관 수축 증후군: 갑작스러운 심한 두통, 번개 두통, 구역, 구토, 혼돈, 발작, 시각 장애 등이 발현될 수 있습니다.
- 3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오.
- 2) 장기간 계속 복용하지 마십시오.
- 3) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피하십시오.
- 4) 복용 시에는 음주하지 마십시오.

7. 소아에 대한 투여 만 2세 미만에게 투여하지 마십시오. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받으십시오.

8. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법 및 사용기간】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

【포장단위】 10캡슐(PTPX1)/상자

※ 구입 시 사용기한 또는 유효기간이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회고시 "소비자분쟁해결기준"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 본 설명서 작성년월일 이후에 변경된 내용은 아래 제품 문의 또는 식품의약품안전처 의약품안전나라 의약품통합정보 시스템 (<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 통하여 확인하실 수 있습니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223 또는 14-3330)

■ 제품문의 : (02)2211-6700, www.sinilpharm.com

【제조·판매】 신일제약(주)

본사 : 서울특별시 동대문구 사가정로 272
공장 : 충청북도 충주시 양성면 복상골길 28



설명서 개정년월일 : 2025.02.24