

징코플로우정_설명서

- 사이즈 : 160 x 200 mm
- 재질 : 모조지 70g
- 사양 :양면인쇄(1도)

자재명	징코플로우정_설명서		
관리번호	N2508	작성자	남주리
검토	검토	확인	확인

요청일자	전달일자	내용
7.11	7.14	1차 (신규 제작)
7.22	7.25	2차 (관리번호 수정, 문안 수정)
8.12	8.12	3차 (문안수정)

N2508

KGMP

우수 의약품
제조지정업체

일반의약품

하루 한 알 고함량

징코플로우정

240밀리그램

(은행엽건조엑스)

【성분·함량】 1정 중

- 유효성분 : 은행엽 건조엑스(생규) 240mg
- 첨가제(타르색소) : 청색1호, 황색203호
- 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소-우유)
- 기타첨가제 : D-만니톨, 경질무수규산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 크로스카멜로오스나트륨, 탈크, 탭실드녹색(99G1033)

【성상】 녹색의 장방형 필름코팅정제

【효능·효과】 집중력 저하, 기억력 감퇴, 현기증(동맥경화 증상)과 같은 증상이 동반되는 정신 기능 저하

【용법·용량】 은행엽건조엑스로서 1회 240 mg, 1일 1회 1정 복용하십시오. 식사와 관계없이 복용할 수 있습니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 마십시오.
- 1) 은행엽건조엑스 또는 이 약의 다른 성분에 대한 과민증이 있는 환자

2) 어린이와 청소년에서 이 약의 복용(사용)에 대한 연구가 충분하지 않습니다. 따라서 이 약은 18세 미만의 어린이와 청소년에게 사용해서는 안 됩니다.

3) 임신부

4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.
2. 이 약을 복용(사용)하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 마십시오.
- 1) 항응고제(예: 펜프로쿰온, 와파린, 클로피도그렐, 아세틸살리실산 및 기타 비스테로이드성 항염증제)를 병용투여(함께 복용(사용))하는 경우, 이들의 약효가 강화되는 것을 배제할 수 없습니다.

2) 다른 의약품과 마찬가지로 이 약도 시토크롬 P450, 3A4, 1A2, 2E1, 2C9를 통해 다양한 다른 의약품의 대사에 영향을 미치는 것을 배제할 수 없으며, 효능 및/또는 효력 지속 시간을 변화시킬 수 있습니다. 이 약을 니페디핀 및 딜티아젠크와 같은 칼슘채널차단제와 병용투여(함께 복용(사용))할 경우 생체이용률에 영향을 미침으로써 이들 물질의 활성 수준이 더 높아질 위험이 있습니다. 경구용 테오필린과 병용투여(함께 복용(사용))할 경우 배설에 영향을 끼침으로써 낮은 활성 수준이 나타날 위험이 있습니다. 따라서 주의깊게 모니터링하고 용량을 조절해야 합니다.
3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
- 1) 출혈 장애가 있거나 출혈의 위험을 증가시키는 약물을 복용(사용)하고 있는 환자는 의학적 조언을 구해야 합니다.

2) 수유부(모유로 이행여부가 알려지지 않았습나다.)

3) 이 약을 복용(사용)하여 뇌전증 환자의 추가 발작이 촉진되는 것을 배제할 수 없습니다.
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지하십시오.
- 1) 이 약을 복용(사용)하면 출혈 위험이 증가할 가능성이 있으므로 안전을 위해 수술 전 최소 36시간 전에 이 약의 복용(사용)을 중단해야 합니다.

2) 복용기간은 증상의 정도에 따라야 하며 최소 8주 이상 지속되어야 합니다. 3개월 후 증상이 호전(나아짐)되지 않거나 증상이 악화되면 의사에게 복용(사용)을 지속해도 되는지 확인해야 합니다.

3) 이상반응
 - 위장 장애 : 오심(구역) 등의 위장관 증상
 - 신경계 : 매우 드물게 두통, 불면증, 불안, 혼란
 - 피부 : 매우 드물게 알레르기 반응(예: 피부 홍반(붉은 반점), 부어오름, 가려움증), 알레르기성 쇼크가 있을 수 있습니다. 장기 사용의 경우 출혈이 일어난 사례가 보고되었습니다.

- 4) 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989-2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났습니다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아닙니다.
 - 어지러움
 - 가려움증
- 5) 아나필락시스 또는 아나필락시스 반응 보고가 있습니다. 다만, 이로써 해당성분과 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아닙니다.
5. 기타 이약의 복용(사용)시 주의할 사항
- 이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않습니다.
6. 저장상의 주의사항
- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

【저장방법 및 사용기한】 기밀용기, 상온(15~25℃)보관, 외부용기에 표기

【포장단위】 60정/PTP(상자), 120정/PTP(60정/PTP*2)(상자)

- ※ 구입 시 사용기한이 경과되었거나 유통과정 중 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회 고시 ‘소비자 분쟁 해결 기준’에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.
- ※ 첨부된 문서의 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 아래 제품문의 및 홈페이지 또는 식품의약품안전처 의약품안전나라 의약품통합정보시스템 (<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 통하여 확인할 수 있습니다.
- ※ 부작용 보고 및 피해구제 신청: 한국약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

【제품문의】 02)2211-6700, www.sinilpharm.com

코스닥상장

【제조의뢰자】 신일제약(주)

본사 : 서울특별시 동대문구 사가정로 272
공장 : 충청북도 충주시 양성면 복삼골길 28

【제조자】 코스맥스파마(주)

(전공정제조) 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 168-23
(일부공정제조) 충청북도 제천시 바이오밸리3로 30 일부



설명서 작성(개정)년월일 : 2025.08.12