

일반의약품

조제용

환인징코정

240mg

은행업건조엑스 240mg

WGKIP-0

※ 본 제품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 첨부문서를 본 제품과 함께 보관하십시오.

일반의약품

조제용

환인징코정 240mg

은행업건조엑스 240mg

■ 원료약품의 분량 : 1정 중

- 유효성분 : 은행업건조엑스(생규).....240.00mg
- 첨가제(타르색소) : 청색 1호(브릴리안트블루 FCF) 알루미눔레이크, 황색 203호(퀴놀린엘로우 WS) 알루미눔레이크
- 첨가제(동물유래) : 유당수화물(소, 우유)
- 기타 첨가제 : 경질무수규산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 크로스카멜로오스나트륨, 탈크, 탭실드녹색(99G1033), D-만니톨

■ 성상 : 녹색의 정방형 필름코팅정제

■ 효능·효과 :

집중력 저하, 기억력 감퇴, 현기증(동맥경화 증상)과 같은 증상이 동반되는 정신 기능 저하

■ 용법·용량 :

은행업건조엑스로서 1회 240mg, 1일 1회 1정 복용합니다. 식사와 관계없이 복용할 수 있습니다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 마십시오.

- 1) 은행업건조엑스 또는 이 약의 다른 성분에 대한 과민증이 있는 환자
- 2) 어린이와 청소년에서 이 약의 복용(사용)에 대한 연구가 충분하지 않습니다. 따라서 이 약은 18세 미만의 어린이와 청소년에게 사용해서는 안 됩니다.
- 3) 임신부
- 4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 이 약을 복용(사용)하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 마십시오.

- 1) 항응고제(예: 펜프로쿰온, 와파린, 클로피도그렐, 아세틸살리실산 및 기타 비스테로이드성 항염증제)를 병용투여(함께 복용(사용))하는 경우, 이들의 약효가 강화되는 것을 배제할 수 없습니다.
- 2) 다른 의약품과 마찬가지로 이 약도 시토크롬 P450, 3A4, 1A2, 2E1, 2C9를 통해 다양한 다른 의약품의 대사에 영향을 미치는 것을 배제할 수 없으며, 효능 및/또는 효력 지속 시간을 변화시킬 수 있습니다. 이 약을 니페디핀 및 딜티아젠크 같은 칼슘채널차단제와 병용투여(함께 복용(사용))할 경우 생체이용률에 영향을 미침으로써 이들 물질의 활성 수준이 더 높아질 위험이 있습니다. 경구용 테오필린과 병용투여(함께 복용(사용))할 경우 배설에 영향을 끼침으로써 낮은 활성 수준이 나타날 위험이 있습니다. 따라서 주의깊게 모니터링하고 용량을 조절해야 합니다.

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 출혈 장애가 있거나 출혈의 위험을 증가시키는 약물을 복용(사용)하고 있는 환자는 의학적 조언을 구해야 합니다.
- 2) 수유부(모유로 이행여부가 알려지지 않음)
- 3) 이 약을 복용(사용)하여 뇌전증 환자의 추가 발작이 촉진되는 것을 배제할 수 없습니다.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약을 복용(사용)하면 출혈 위험이 증가할 가능성이 있으므로 안전을 위해 수술 전 최소 36시간 전에 이 약의 복용(사용)을 중단해야 합니다.

2) 복용기간은 증상의 정도에 따라야 하며 최소 8주 이상 지속되어야 합니다. 3개월 후 증상이 호전(나아짐)되지 않거나 증상이 악화되면 의사에게 복용(사용)을 지속해도 되는지 확인해야 합니다.

3) 이상반응

- 위장 장애 : 오심(구역) 등의 위장관 증상.
- 신경계 : 매우 드물게 두통, 불면증, 불안, 혼란
- 피부 : 매우 드물게 알레르기 반응(예: 피부 홍반(붉은 반점), 부어오름, 가려움증). 알레르기성 쇼크가 있을 수 있습니다.

장기 사용의 경우 출혈이 일어난 사례가 보고되었습니다.

4) 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989~2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났습니다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아닙니다.

- 어지러움
- 가려움증

5) 아나필락시스 또는 아나필락시스 반응 보고가 있습니다. 다만, 이로써 해당성분과 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아닙니다.

5. 기타 이약의 복용(사용)시 주의할 사항

이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않습니다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.

■ 저장방법 : 기밀용기, 상온(15~25℃)보관

■ 포장단위 : 30, 300점

■ 제품문의처 : 고객센터전화(080-405-1238)

약은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

※ 본 제품은 GMP 규정에 따라 엄격한 품질 관리를 필한 제품입니다. 사용기한의 경과, 변질, 변패, 오염되거나 손상된 제품은 약국 개설자 및 의약품 판매업자를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 의약품 부작용 신고 · 피해구제 상담 : 1644-6223, 피해구제 상담 전용 : 14-3330

※ 이 첨부문서 개정일자(2025년 3월 17일) 이후 변경된 내용은 www.whanin.com이나 고객센터전화(080-405-1238)에서 확인하실 수 있습니다.

문안최종개정일자 : 2025.03.17
WGKIP-0

■ 제조의뢰자  **한인제약(주)**

경기도 안성시 공단로 50

■ 제조자 : 코스맥스파마(주)

충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 168-23

충청북도 제천시 바이오밸리3로 30 일부