

FILE NAME	칼티산정 공용설명서
SIZE(mm)	125*173mm
DATE	D250320
VERSION NO.	-
DRUG CODE	-

COLORS
■ K 100

NOTE

비타민 복합제

일반의약품 KGMP 적격업체

칼티산 정

【성분·함량】1정(644밀리그램) 중
·유효성분 : 시트르산칼슘수화물(USP)(칼슘(으)로서 100.11mg) 457.0mg
클레칼시페롤농축분말(EP)(비타민D(으)로서 1,000 I.U) 10.0mg
폴산(KP) 1.0mg
티아민염산염(KP) 10.0mg
·기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 전산화전분, 탭탈드분홍색(11P1178), 히드록시프로필셀룰로오스

【성 상】
분홍색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】
다음 경우의 비타민 D, B1의 보급
- 육체피로
- 임신·수유기
- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하 시
- 발육기
- 노년기

이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
- 뼈, 이의 발육불량
- 구루병의 예방

【용법·용량】
성인 : 1일 1회, 1회 1정 복용한다.

【사용상의주의사항】
1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장(콩팥)질환 환자
2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
3) 만 12개월 미만의 젖먹이
4) 신장(콩팥)결석 환자
5) 심한 증상의 신부전 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
1) 인산염, 칼슘염, 경구(먹는, 복용하는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
① 비타민 D는 모유로 분비되어 산생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다
3) 심장·순환기계기능 장애 환자
4) 신장(콩팥)장애 환자
5) 저단백혈증 환자
6) 강심배당체를 투여 중인 환자
7) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 :
구역, 구토, 설사, 묽은 변, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진
2) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
3) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.
4) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용 투여 시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
5) 우발적으로 과량복용 한 경우
6) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전 후에는 피할 것.

6. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법 및 사용기간】
저장방법 : 밀폐용기, 실온(1 ~ 30℃) 보관
사용기간 : 제조일로부터 36개월

【포장단위】30 정/병, 90 정/병

※ 제조의뢰자 : 대우제약(주) 부산광역시 사하구 다대로 153(신평동)
※ 제 조 자 : 메디스제약(주) 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단6로 170

※ 제품의 안정성을 위해 반드시 복용시까지 포장상태를 유지하여 주십시오.
※ 본 의약품은 엄격한 품질관리하에서 제조된 (KGMP) 적격업체 제품입니다.
※ 사용(복용) 전 본 첨부문서를 자세히 읽어보시고 첨부문서는 약과 함께 보관하십시오.
※ 정해진 용법·용량을 준수하시고 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상의하십시오.
※ 의약품을 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
※ 유효기한 또는 사용기간이 지난 의약품을 사용(복용)하지 마십시오.
※ 만약 구입한 시점에 유효기한 또는 사용기간이 지났거나 유통과정 중 변질·변패·오염된 의약품은 구입한 약국 및 판매처를 통해 교환 받을 수 있습니다.
※ 의약품 복용으로 인한 부작용이 발생했을 경우 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)에 부작용 피해 구제를 신청하실 수 있습니다.
※ 본 첨부문서의 최종 개정연월일 이후 변경된 내용 또는 기타 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보 시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.