

라이트칼디코정

일반의약품

조제용

【원료약품 및 그 분량】 이 약 1정(644밀리그램) 중

■ 유효성분 :

시트르산칼슘수화물(USP)·····475밀리그램(칼슘으로서 100,11밀리그램)

콜레칼시페롤농축분말(EF)·····10밀리그램(비타민D로서 1,000아이,유)

폴산(KP)·····1밀리그램

티아민염산염(KP)·····10밀리그램

■ 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 전분글리클산나트륨, 전호화진분, 탭설드분홍색(HP178), 하드록시프로필셀룰로오스

【성상】 분홍색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】

○ 다음 경우의 비타민 D, B₁₂의 보급

- 육체피로

- 임신·수유기

- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하 시

- 발육기

- 노년기

○ 이 약에 함유된 티아민 등의 효능·효과는 다음과 같다.

- 뼈, 이의 발육불량

- 구루병의 예방

【용법·용량】

성인 : 1일 1회, 1회 1정 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcaemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유훑증증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장(콩팥)질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 3) 만 12개월 미만의 영아
- 4) 신장(콩팥)결석 환자
- 5) 심한 증상의 신부전 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구(먹는, 복용하는)용 테트라사이클린 계 제제, 제산제

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- ① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다
- 4) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 5) 신장(콩팥)장애 환자
- 6) 저단백혈증 환자
- 7) 강심배당체를 투여 중인 환자
- 8) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 변비, 저혈압, 얼굴열아오름, 심박동불규칙, 피부발진
- 2) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다
- 3) 정기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.
- 4) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용(사용)) 투여 시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
- 5) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 6) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용후 후에는 피할 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【포장단위】 30정/병, 90정/병

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【사용(유효)기간】 제조일로부터 36개월

【제조외회자】 ㈜라이트팜텍 경기도 평택시 청북읍 고령산단로 89

【제조자】 메디스제약㈜ 전북특별자치도 완주군 봉동읍 원주산단6로 170

- ※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 이 약을 사용하시기 전에 반드시 본 설명서를 읽어주시기 바랍니다.
- ※ 본 설명서를 잘 보관하여 필요한 경우 참조하시기 바랍니다.
- ※ 이 제품 설명서 작성년월일 이후 변경된 내용은 소비자상담실(02-801-8570)로 문의하시거나 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 부작용 피해구관 신청을 한국약물안전관리원(1644-6223, 14-3330)에서 할 수 있습니다.
- ※ 육안으로 이물질이 발견될 시 사용하지 마십시오.

작성년월일: 2025년 03월 20일
문서번호: OPIS115(00)

【제조외회자】

 Bio Frontier
LitePharmTech
(주)라이트팜텍

【제조자】

 Medix
메디스제약
MEDIX PHARM. CO., LTD.

Check List		Color	
File Name	라이트칼디코정 설명서		K
Type(Material)			
Size(LxWxH/mm)	125x173		
Date(Y/M/D)	2025년 03월 20일		
Version No.	OPIS115(00)		
Country	대한민국		
Print Corp.	7point		
			
			
			