

복합비타민제

일반의약품

조제용

지노칼시움정

【원료약품 및 그 분량】 1정(644mg) 중

유효성분 :

시트르산칼슘수화물(USP)(칼슘으로서 100, 11mg) ... 475mg
 콜레칼시페롤농축분말(EP)(비타민D로서 1,000IU) 10mg
 폴산(KP) 1mg
 티아민염산염(KP) 10mg
 기타첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산 나트륨, 전호화전분, 탈프드분홍색(11P1178), 히드록시프로필셀룰로오스

【성상】 분홍색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】

- 다음 경우의 비타민 D, B₁의 보급
 - 육체피로
 - 임신·수유기
 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하 시
 - 발육기
 - 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 뼈, 이의 발육불량
 - 구루병의 예방

【용법·용량】 성인: 1일 1회, 1회 1정 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - ① 고칼슘혈증(hypercalcaemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장(콩팥)질환 환자
 - ② 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - ③ 만 12개월 미만의 젖먹이
 - ④ 신장(콩팥)결석 환자
 - ⑤ 심한 증상의 신부전 환자
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - ① 인산염, 갈슘염, 경구약은, 복용하는용 테트라사이클린계 제제, 제산제
3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - ① 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - ② 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - ① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다
 - ④ 심장·순환기계기능 장애 환자
 - ⑤ 신장(콩팥)장애 환자
 - ⑥ 저단백혈증 환자
 - ⑦ 강심배당체를 투여 중인 환자
 - ⑧ 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진
- 2) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다
- 3) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.
- 4) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용 투여 시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
- 5) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 6) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전 후에는 피할 것.
6. 저장상의 주의사항
 - ① 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - ② 직사광선을 피하고 밀 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
 - ③ 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【포장단위】 30정/병, 90정/병

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃) 보관

【제조사】 메덱스제약㈜

전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단6로 170

【제조회사】 진양제약㈜

강원특별자치도 원주시 지정면 신평로 34

※ 【최신 제품 정보 확인 방법】이 첨부문서 작성일자(2025.03.13) 이후 변경된 내용은 진양제약 홈페이지(www.jinyangpharm.com)나 고객센터(02-3470-0350)를 통하여 확인할 수 있습니다.

※ 본 제품을 복용하기 전에 사용설명서를 주의 깊게 읽어야 하며, 사용설명서는 본 제품과 함께 보관하십시오.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 부작용 피해구제 신청 : 한국 의약품안전관리원(1644-6223)



진양제약