

일반 의약품
KGMP적격업체
분류번호 : 112

비습관성 수면유도제

자모다정

■ 원료약품 및 분량 (1정 중)

유효성분
독시라민속신산염(USP) 25.0 mg
첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)
기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 콜로이드성이산화규소

■ 성상

흰색의 타원형 정제

■ 효능·효과

불면증의 보조치료 및 진정

■ 용법·용량

성인 : 독시라민속신산염로서 1일 1회 25 mg을 반드시 수면 30분전에 경구투여한다. 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

■ 사용상의 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
 - 폐기종, 만성 기관지염 천식 등의 호흡장애 환자
 - 녹내장 환자
 - 전립선(전립샘) 비대 환자
 - 수유부
 - 15세 이하의 소아
 - 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것
이미프라민계 항우울약, 항파킨슨제, 디소피라미드와 병용(함께 복용)시 소변축적, 변비 등의 이상 반응이 증가할 수 있으므로 주의한다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것
 - 의사 또는 약사와 상의 없이 다른 약물과 병용(함께 복용)하거나 2주 이상 투여하지 않는다.
 - 과도한 진정이 나타날 수 있으므로 고소작업이나 자동차 운전 등 위험이 수반되는 기계조작을 하지 않도록 주의한다.
 - 음주 후 또는 음주 시에 이 약을 투여하지 않는다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것
임부 및 임신 중이거나 임신할 가능성이 있는 사람
- 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
 - 때때로 항콜린작용이 나타날 수 있다.
 - 이 약 투여 시 졸음이 올 수 있으므로 취침 시에 투여한다.
 - 낮에 졸음이 나타날 경우에는 용량을 감소한다.
- 저장상의 주의사항
 - 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

- **저장방법** : 차광·밀폐용기, 실온(1~30 ℃)보관
- **포장단위** : 10정/PTP
- **사용기한** : 외부포장참조
- **제조판매자** : (주)와이에스생명과학 / 경기도 이천시 모가면 공원로 133-1
소비자상담실 전화번호 : 070-5172-6451

※ 의약품 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.
※ 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 의하여 엄격한 품질관리를 완료한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 지났거나 유통과정 중 변질·변패 또는 오손된 제품이 있으면 사용하지 마시고, 구입한 약국에서 교환하시기 바랍니다.
※ 의약품은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하시기 바랍니다.
※ 사용기한이 지난 의약품은 복용하지 마십시오.
※ 본 제품 사용으로 인한 부작용 피해구제 신청은 한국약품안전관리원(1644-6223)에서 할 수 있습니다.
※ 작성일자 이후 변경된 내용은 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

작성일자 : 2025년 3월 20일
개정번호 : JMDT-PL-01

