

구분	업체명	제품명	규격(장,고/mm)		색상	접지	지류	평량/두께	비고
설명서		네오칼큐정	125	173	먹100				신규디자인, 메딕스제약 포장 사양에 따름

30T, 90T 공용설명서

사이즈 : 125 x 173

일반의약품 **조제용**

네오칼큐정

[원료약품 및 분량] 이 약 1정 중

- 유효성분
시트르산칼슘수화물(USP)(칼슘으로서 100.11mg) 475mg
콜레칼시페롤농축분말(EP)(비타민D로서 1,000I.U) 10mg
폴산(KP) 1mg
티아민염산염(KP) 10mg
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 전호화전분, 탭실드분홍색(11P1178), 히드록시프로필셀룰로오스

[성상]

분홍색의 장방형 필름코팅정

[효능·효과]

- 다음 경우의 비타민 D, B₁ 의보급
 - 육체피로
 - 임신·수유기
 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하 시
 - 발육기
 - 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 뼈, 이의 발육불량
 - 구루병의 예방

[용법·용량]

성인: 1일 1회, 1회 1정 복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장(콩팥)질환 환자
- 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 만 12개월 미만의 젖먹이
- 신장(콩팥) 결석 환자
- 심한 증상의 신부전 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 인산염, 칼슘염, 경구(먹는, 복용하는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제

3. 다음과 같은사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 의사의 치료를 받고 있는 환자

- 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - ① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다
- 심장·순환기계기능 장애 환자
- 신장(콩팥)장애 환자
- 저단백증 환자
- 강심배당체를 투여 중인 환자
- 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 변비, 저혈압, 얼굴 달아오름, 심박동불규칙, 피부발진
- 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결성증이 나타날 수 있다.
- 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용 투여 시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
- 우발적으로 과량복용 한 경우
- 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전 후에는 피할 것.

6. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.
- 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법]

밀폐용기, 실온(1~30℃) 보관

[사용기간]

제조일로부터 36개월

[포장단위]

30정/병, 90정/병

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며, 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 제품은 약국개별자 또는 의약품판매업자에 한하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회에서 고시한 “소비자 분쟁해결기준”에 의거, 정당한 소비자피해에 대해 보상해 드립니다.
- ※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- ※ 첨부문서 최종 개정연월일(2025.03.27) 이후 변경된 내용은 의약품안전나라(<https://nedrug.mfds.go.kr>)의 ‘의약품 검색’란을 통해 확인하실 수 있습니다.
- ※ 제품의 사용기간은 외부 포장에 표기되어 있습니다.
- ※ 부작용보고 및 피해구제신청: 한국의약품안전관리원(1644-3330 혹은 1644-6223)

[제조의뢰자] 주식회사제뉴원사이언스

세종특별자치시 전의면 산단길 245

[제조사] 메딕스제약(주)

전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단6로 170

KO-2503

작업선

재단선