

갑상선호르몬제

썬지록신^[정 112μg]

전문의약품
분류번호:243

갑상선호르몬제

썬지록신^[정 112μg] (레보티록신나트륨수화물)

[원료약품의 분량] 1정 중

■유효성분: 레보티록신나트륨수화물(EP) 112μg
■첨가제 (타르색소): 황색203호알루미늄레이크
■첨가제 (동물유래성분): 유당수화물(소의 우유), 젤라틴(소의 가죽)
■기타 첨가제: 메글루민, 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 크로스카르멜로오스나트륨

[성상]

연한 노란색의 타원형 정제

[효능·효과]

갑상선기능저하증, 점액부종, 크레틴병

[용법·용량]

성인: 레보티록신나트륨으로서 보통 1회 1회 25~400μg 경구투여합니다. 일반적인 초회 투여량은 25~100μg이며, 유지량은 100~400μg입니다.

단, 연령 및 증상에 따라 적절히 증감합니다.

[사용상의 주의사항]

1. 경고
갑상선 기능이 정상인 사람이 체중감소를 위해 갑상선 호르몬제를 단독 또는 다른 약물과 병용투여하는 것은 적절하지 않으며 효과가 없습니다. 특히 식욕감퇴 효과가 있는 교감신경 흥분성 아민과 병용투여시 생명을 위협할 정도의 심각한 독성 이 발생할 수 있습니다.

2. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

1) 급성 심근경색, 급성 심근염, 급성 전층 심장염 환자 (기초대사항진으로 심부하가 증대되어 병세가 악화될 수 있습니다.)

2) 중증 협심증 환자

3) 빈맥을 동반한 심부전 환자

4) 심근염 환자

5) 갑상선기능항진증 환자

6) 치료 전 부신기능부전증 환자

7) 갑상선종축증 환자

8) 이 약에 과민증 환자

9) 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오

1) 고혈압, 협심증, 전구성 심근경색, 동맥경화증, 관상동맥질환 등 심혈관계 질환 환자(기초대사항진으로 심부하가 증대되어 병세가 악화될 수 있으므로 투여할 필요가 있는 경우에는 투여개시량을 소량으로 하고 보통보다 장기간에 걸쳐 증량 하며 유지량은 최소필요량으로 합니다.)

2) 부신피질기능부전, 뇌하수체기능부전 환자(부신발증, 속 등을 유발할 수 있으므로 부신피질기능부전의 개선을 충분히 고려하여 투여합니다)

3) 당뇨병 환자(혈당조절조건이 변화될 수 있으므로 충분히 고려하여 신중히 투여합니다)

4) 고령자

5) 중증 또는 장기간 지속된 갑상선기능저하증 환자

4. 부작용

1) 이 약은 과량투여로 다음과 같은 부작용이 나타날 수 있으므로 감량 또는 휴약 등 적절한 처치를 합니다.

① 순환기계: 심계항진, 맥박증가, 부정맥, 협심증, 맥압의 상승

② 정신신경계: 진전, 불면, 두통, 어지러움, 발한, 신경과민, 흥분, 불안, 조울 등의 정신 질환, 경련

③ 소화기계: 식욕부진, 구토, 설사, 복부경련

④ 기타: 근육통, 월경장애, 체중감소, 무력감, 다한증, 피부의 홍조

2) 과민증: 발진 등이 나타날 수 있으며 이러한 경우에는 투여를 중지합니다.

3) 간: 간기능 장애가 나타날 수 있으며 발열, 권태감, 간기능 검사치의 이상 등이 나타난 경우에는 감량 또는 휴약 등 적절한 처치를 합니다.

4) 기타: 동공산대, 소아의 고칼슘노증, 발작성한 증가(발작질환이 있는 소아의 경우)가 나타날 수 있습니다.

5. 일반적주의

1) 갑상선기능저하증 및 점액부종 환자에게는 소량부터 시작하여 투여하고 충분히 관찰하면서 점차 증량하여 유지량으로 하는 것이 바람직합니다.

2) 당뇨병 환자에 갑상선 호르몬 요법을 병용시 인슐린 또는 경구용 혈당강화제의 용량을 증량합니다.

3) 고혈압을 포함한 심혈관계 질환 환자에게 이 약을 투여할 경우 흉통의 발진 또는 다른 심혈관계 질환의 악화가 있을 경 우 이 약을 감량하는 등 주의합니다.

4) 당뇨병, 요붕증 또는 부신피질부전 환자에게 갑상선호르몬 요법시 그 증상의 강도를 심화시키므로 이러한 병병하는 내 분비 질환에 대한 다양한 치료적 조치를 적절히 합니다.

5) 점액부종 혼수에 있어 당질코르티코이드의 병용투여가 필요합니다.

6) 초극저체중 신생아 치료시 부신기능 미성숙으로 인해 순환허탈이 발생할 수 있으므로 혈행 역학적 지표를 모니터링해 야 합니다.

7) 비오틴은 갑상선 면역분석검사에 간섭을 유발하여 검사 결과가 실제보다 낮게 또는 높게 측정될 수 있습니다. 갑상선 기 능검사가 요구될 때 비오틴 성분제제를 복용 중인 환자는 그 사실을 검사원에게 알려야 합니다. 가능한 경우, 비오틴 간 섭에 영향을 받지 않는 대체 검사를 실시해야 합니다.

6. 상호작용

1) 쿠마린계 항응고제와 병용투여시 갑상선호르몬이 비타민K의존성 응고인자의 이화를 촉진하여 상승작용이 나타날 수 있으므로 프로트롬빈시간을 측정하는 등 충분히 관찰하고 쿠마린계 항응고제의 용량을 조절하는 등 신중히 투여합니 다.

2) 에피네프린, 노르에피네프린, 에페드린 및 메절에페드린 함유제제 등 교감신경효능약과 병용투여시 교감신경효능약의 작용이 증강되어 관상동맥질환 환자에서 관부전의 위험이 증대되므로 신중히 투여합니다.

3) 디곡신, 디기톡신 등 강심배당체와 병용투여시 갑상선 기능 항진상태에서의 혈청 디곡신 농도가 저하되어 갑상선기능 항진 상태가 상승된다는 보고가 있으므로 갑상선 기능 항진상태에는 보통 다량, 갑상선 기능 저하 상태에는 보통 소량의 강심배당체를 투여합니다. 병용투여시 강심배당체의 혈청농도를 측정하면서 신중히 투여합니다.

4) 인슐린 등 혈당강화제를 투여받는 환자에게 이 약을 투여하는 경우 혈당조절 조건이 변화될 수 있으므로 병용투여시 혈 당치 및 환자의 상태를 충분히 관찰하면서 두 약물의 투여량을 조절하는 등 신중히 투여합니다.

5) 콜레스테라민, 철분제제, 알루미늄 함유 제산제와 병용투여시 이 약의 흡수가 지연 또는 감소될 수 있으므로 투여간격에 주의하여 신중히 투여합니다.

6) 항진간제(페니토인, 카르바마제핀 등), 바르비탈계 약물, 리팜피신 등의 효소유도약물은 이 약의 신진대사를 증가시켜 이 약의 혈중농도를 저하시킬 수 있으므로 병용투여시 이 약을 증량하는 등 신중히 투여합니다.

7) 페니토인 및 카르바마제핀은 이 약을 혈장 단백 결합에서 해리함으로써 이 약의 효능을 상승시킬 수 있습니다.

8) 에스트로겐 또는 에스트로겐을 함유하는 경구용 피임약과 병용투여시 티록신결합글로불린의 양이 증가되어 이 약의 수 요가 증가될 수 있습니다.

9) 아마오다론 및 프로프라놀롤은 이 약의 분해를 늦춰 효능발현기간을 연장할 수 있습니다.

10) 이 약은 삼환계 항우울약의 작용발현개시를 촉진할 수 있습니다.

11) 설리살산, 푸로세미드, 클로피브레이트 등은 이 약의 혈장 함유율을 증가시킬 수 있습니다.

12) 갈슘제제, 세발라며, 란타늄 등의 인산염과 결합하는 약물을 병용투여시 이 약의 흡수가 지연 또는 감소될 수 있으므로 투여간격에 주의하여 신중히 투여합니다.(최소 4시간 간격)

13) 레보티록신과 오르리스타트 동시 복용 시 갑상선 저하증 및/또는 갑상선 저하증 조절 저하가 발생할 수 있습니다.

14) 비오틴은 비오틴/스트렙타비딘 상호작용을 기반으로 하는 갑상선 면역분석법을 방해하여 검사 결과가 감소하거나 증 가할 수 있습니다.

15) 세인트존스워트가 포함된 제품과 같은 효소 유도 약물은 레보티록신의 간 청소율을 증가시켜 갑상선 호르몬의 혈청 농

도를 감소시킬 수 있습니다. 갑상선 대체 요법을 받는 환자는 이러한 제품을 동시 투여 시 갑상선 호르몬 용량을 늘려 야 할 수 있습니다.

16) 프로톤 펌프 억제제(PPI)와의 병용투여는 갑상선 호르몬의 흡수를 감소시킬 수 있습니다. 병용 치료 동안 갑상선 기능 의 정기적 모니터링 및 임상 모니터링이 권장되며, 갑상선 호르몬의 용량을 늘려야 할 수도 있습니다. PPI 치료가 끝날 때도 주의를 기울여야 합니다.

7. 임부 및 수유부에 대한 투여

1) 갑상선 호르몬은 태반 관문을 쉽게 통과하지 않습니다. 현재까지의 임상 경험 결과 임부에 갑상선 호르몬을 투여했을 때 태아에 대한 부작용이 나타나지 않았으므로 임신 중에도 치료를 중단하지 않습니다.

2) 갑상선 호르몬은 소량 유즙으로 분비됩니다. 갑상선호르몬은 심각한 부작용과 관련이 없으며 종양을 발생시키지 않으 나 이 약을 수유부에 투여시 주의합니다.

8. 소아에 대한 투여

1) 크레틴병에 대한 진단 및 치료의 시작은 발육결핍을 방지하기 위하여 가능한 한 출생 후 바로 시작합니다. 혈장 레보티 록신(T₄) 및 갑상선자극호르몬(TSH) 농도의 선별검사를 하여 신생아 중 이런 진단을 구분할 수 있습니다.

2) 선천성 및 후천성 갑상선 저하증 소아 환자의 경우, 불충분한 치료는 인지 발달과 선형 성장에 부정적 영향을 미칠 수 으며, 과잉 치료는 두개골 유합증과 골연령 가속화와 연관이 있습니다.

9. 고령자에 대한 투여

고령자에 이 약을 투여시 기초대사항진으로 심부하가 증대되어 협심증 등의 증상이 나타날 수 있고 일반적으로 고령자는 생 리기능이 저하되어 있으므로 투여 개시량을 소량으로 하고 보통보다 장기간에 걸쳐 증량하며 유지량은 최소 필요량으로 합 니다.

10. 임상검사치에의 영향

1) 갑상선결합글로불린(TBG)의 농도 변화를 T₄ 및 T₃치의 해석에 있어 고려합니다. 그런 경우에는 비결합 호르몬의 농도 치를 측정합니다. 임신, 에스트로겐, 에스트로겐 함유 경구용 피임약 및 전염성 감염은 티록신결합글로불린의 농도를 증 가시키는 반면 신중, 선단비대증 및 안드로겐 또는 코르티코이드 요법 동안에는 감소됩니다. 가족성 티록신결합 저글로 불린혈증 및 고글로불린혈증이 보고되었습니다. 티록신결합글로불린 결핍의 확률은 약 1/9,000입니다. 알부민과 티록 신의 결합은 살리살산에 의해 억제됩니다.

2) 의약품 또는 식이성 요오드는 모든 방사선 요오드 흡착 생체내 (in vivo) 시험을 방해하여 낮은 흡착율을 보이는데, 이것 은 호르몬 생합성이 실제로 감소함을 반영하는 것은 아닙니다.

3) 적절한 용량 대제에도 불구하고 갑상선기능저하증의 지속이 임상적 및 실험실적 증거로 나타나는 것은 환자의 낮은 순 응성, 낮은 흡수율, 변으로의 배출과다 또는 제제의 비활성화를 의미하며 갑상선 호르몬에 대한 세포내 저항은 매우 드 립니다.

11. 과량투여시의 처치

1) 증상: 심계항진, 맥박증가, 부정맥, 협심증, 율혈성 심부전, 진전, 불면, 두통, 어지러움, 발한, 신경과민, 흥분, 불안, 조울 등의 정신증상, 식욕부진, 구토, 설사, 근육통, 월경장애, 체중감소, 무력감, 피부의 홍조

2) 처치

① 1회의 과량투여시 구토유발, 위세척, 콜레스티라민 또는 약용탄을 투여하여 이 약의 흡수를 억제하거나 대증요법을 실시합니다.

② 처치: 환기유지를 위해 산소를 공급합니다. 교감신경흥분증상에는 프로프라놀롤 등 베타차단제를, 율혈성심부전에는 강심배당체를 투여하여 발결, 저혈당 및 체액소실에 대해서는 적절한 처치를 합니다. 티록신의 흡수를 억제하기 위해 콜레스티라민을 투여하거나 T₄의 T₃로의 전환을 억제하기 위해 당질코르티코이드를 적용하는 등 다른 보조적 인 방법이 있습니다.

12.의약품동등성시험 정보

가. 시험약 썬지록신정150마이크로그램(레보티록신나트륨수화물)/((주)다림바이오텍)과 대조약 썬지로이드정0.1밀리그램 (레보티록신나트륨수화물)(부광약품(주))을 2X2 교차시험으로 시험약 4정 및 대조약 6정씩 건강한 성인 38명에게 공 복 시 단회 경구투여하여 혈중 레보티록신을 측정한 결과, 비교평가항목치(AUC_{0-∞}, C_{max})를 로그변환하여 통계처리하였 을 때, 기하평균비율의 90% 신뢰구간이 80.00~125.00% 이내로서 생물학적으로 동등함을 입증하였습니다.

구 분		비교평가항목		참고평가항목	
		AUC _{0-480hr} (ng·hr/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
대조약	썬지로이드정0.1밀리그램 (레보티록신나트륨수화물) (부광약품(주))	1676±284	61.54±12.41	1.50 (1.00~4.00)	65.53±25.15
시험약	썬지록신정150마이크로그램 (레보티록신나트륨수화물) (주)다림바이오텍)	1580±231	59.87±10.26	1.50 (1.00~4.00)	77.57±46.75
기하평균비율의 90% 신뢰구간 (기준: 80.00~125.00%)		92.73~ 98.14%	94.08~ 102.71%	-	-
(AUC _{0-∞} , C _{max} , t _{1/2} 평균값± 표준편차, T _{max} : 중앙값(범위), n=38)					
AUC _{0-∞} : 투약시간부터 최종혈중농도 정량시간 t까지의 혈중농도-시간곡선하면적 C _{max} : 최고혈중농도 T _{max} : 최고혈중농도 도달시간 t _{1/2} : 말단 소실 반감기					

나. 의약품동등성시험기준 제7조제2항에 따라, 시험약 썬지록신정112마이크로그램(레보티록신나트륨수화물)(주)다림바이오텍)은 대조약 썬지록신정150마이크로그램(레보티록신나트륨수화물)(주)다림바이오텍)과의 비교용출시험자료를 제출하였으며, 대조약과 용출양상이 동등하였습니다. 이에 따라 해당 자료로서 생물학적동등성을 입증하였습니다.

13. 기타

유사약품(리오티로닌나트륨)의 투여에 의해 드물게 속, 율혈성 심부전이 나타날 수 있다는 보고가 있습니다. 과량투여에 의해 이러한 증상이 나타날 수 있으므로 감량 또는 휴약하는 등 적절한 처치를 합니다.

[포장단위] 100정/병

[저장방법] 차광기밀용기, 실온(1~25℃)보관

[최종 개정연월일] 2025.04.29

[제조주] (주) 다림바이오텍 강원특별자치도 원주시 지정면 신평로 33 A동1층~3층, B동1층, S동

※ 본 제품은 우수약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 의하여 생산된 제품입니다. 구입시 사용기한이 지났거나 유통 과정 중 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.

※ 이 첨부문서의 최종개정연월일 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(https://nedrug.mfds.go.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 의약품 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원에 피해 구제를 신청할 수 있습니다.

제조원

dalim(주)다림바이오텍

강원특별자치도 원주시 지정면 신평로 33 A동1층~3층, B동1층, S동
대표전화: 02) 335-1656 / 소비자상담실: 080) 333-1656(수신자부담)
공장 및 연구소: 033) 738-4600 / 한국의약품안전관리원: 1644-6223, 14-3330

ver.00

>> 접지 후 모습



1. 재질 및 색상, 수량 확인해주세요.
2. 전화번호, 주소 등 중요내용 반드시 확인해주세요.
3. 빠진글자, 틀린글자, 위치 확인해주세요.
4. 같은 데이터라 할지라도 인쇄할 때마다 색상차이가 날 수 있습니다.
5. 색상이 진하고(+5~10%) 흐림 정도(-5%~10%)로는 재작업이 될 수 없습니다.
예를 들면 지난번에는 조금 진하게 인쇄되고 이번에는 조금 흐리게 인쇄되었다면 그 편차는 10%~20%정도로 고객님께서 생각하신 것과 다를 수 있습니다.

※ **상기 사항의 확인 실수로 인한 책임은 당사에 없음을 고지합니다. 정확한 검토 부탁드립니다.**

※ **최종파일 전 시안확인을 원칙으로 하며, 고객센터의 시안 승인 후 진행한 인쇄 결과물에 대하여 완성된 제품은 당사에 책임이 없음을 고지합니다.**