

# 이로마정

• Magnesium hydroxide 500 mg  
• Ursodeoxycholic acid, UDCA 1.5 mg

500 정

분류번호 일반의약품  
**238** **조제용**

## 【원료약품 및 분량】 1정 중

- 유효성분 : 수산화마그네슘(KP) ..... 500mg  
우르소데옥시콜산(KP) ..... 1.5mg
- 기타첨가제 : 크로스카르멜로소나트륨, 유당수화물, 스테아르산마그네슘, 히드록시프로필셀룰로오스, 경질무수규산
- 동물기원 : 유당수화물(소, 우유)

## 【성상】 흰색의 타원형 정제

【용법·용량】 1회 1정 성인(15세이상) 1일 3회, 11세~14세 1일 2회를 식전(식간(식사때와 식사때 사이에) 또는 식후)에 복용한다. 복용간격은 4시간 이상으로 한다. 다만, 초회는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량(양을 늘림) 또는 감량(줄임)한다.

## 【효능·효과】 • 변비

• 변비에 따른 다음 증상의 완화 : 식욕부진(식욕감퇴), 복부팽만, 장내이상발효, 치질

## 【사용상주의사항】

### 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것.

- 1) 급성 복부(배부분)질환(충수염, 장출혈, 궤양성 결장염 등)환자
- 2) 장폐색(창자 막힘)환자
- 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

### 2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 심한 복통(배아픔) 또는 구역, 구토 환자
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 3) 신장애(신장장애) 환자
- 4) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
- 5) 직장의 출혈 혹은 장부전의 병력이 있는 사람

### 3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약을 복용함으로써 발진 · 충혈 되어 붉어짐, 가려움, 심한 복통(배 아픔), 설사, 구토 등이 나타날 경우.
- 2) 1주 정도 투여하여도 변비의 개선이 없을 경우.

### 4. 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.

2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것.

## 5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
- 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

## 【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

## 【사용기간】 제조일로부터 36개월

## 【포장단위】 30정/병, 500정/병, 1000정/병

## 【제 조 자】 **SUNGMI** 성이바이오제약 주식회사

강원특별자치도 원주시 지정면 지래로로 184 1층 일부, 3층

## 【제품문의】 02-3413-3358, www.sungyi.co.kr

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약, 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패, 오염, 손상된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.
- ※ 이 약을 사용하기 전에 반드시 첨부문서를 주의깊게 읽어보시고 첨부문서는 항상 약과 함께 보관하십시오.
- ※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)
- ※ 첨부문서 작성(제개정)년월일 이후 변경된 내용은 제품문의 또는 의약품안전나라 의약품 통합정보 시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 통하여 확인할 수 있습니다.

[V.00]

개정연월일 : 2025.05.09

제조번호:

무코팅  
38 x 22 mm

사용기한:

