분류번호 일반의약품

238 조제용

이로마정

- Magnesium hydroxide 500 mg
- Ursodeoxycholic acid, UDCA 1.5 mg

500정

【원료약품 및 분량】 1정 중

■ 유효성분 : 수산화마그네슘(KP) ····· 500mg
우르소데옥시콜산(KP) ····· 1.5mg

■ 기타첨가제 : 크로스카르멜로오스나트륨, 히드록시프로필셀룰로오스, 경질무수규산, 스테아르산마그네슘, 탭설드흰색(11W001)

■ 동물기원 : 유당수화물(소, 우유)

【성상】 흰색의 타원형 필름코팅정제

【용법·용량】 1회 1정 성인(15세이상) 1일 3회, 11세~14세 1일 2회를 식전(식간(식사때와 식사때 사이에) 또는 식후)에 복용한다. 복용간격은 4시간 이상으로 한다. 다만, 초회는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량(양을 늘림) 또는 감량(줄임)한다.

【효능·효과】 • 변비
• 변비에 따른 다음 증상의 완화 : 식욕부진(식욕감퇴), 복부(배부분)팽만, 장내이상발효, 치질

【사용상주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것.
1) 급성 복부(배부분)질환(중수염, 장출혈, 궤양성 결장염 등)환자
2) 장폐색(창자 막힘)환자
3) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
1) 심한 복통(배아픔) 또는 구역, 구토 환자
2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
3) 신장애(신장(콩팥)장애) 환자
4) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
5) 직장(곧창자)의 출혈 혹은 장부전의 병력이 있는 사람

3.다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 첨부문서(본 기재사항)를 소지할 것.
1) 이 약을 복용함으로써 발진 · 충혈 되어 붉어짐, 가려움, 심한 복통(배 아픔), 설사, 구토 등이 나타날 경우.
2) 1주 정도 투여하여도 변비의 개선이 없을 경우.

4. 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항
1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것.

5. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 30정/병, 500정/병, 1000정/병

【제 조 자】 SUNGvi BIO Pharm 성이바이오제약 주식회사
강원특별자치도 원주시 지정면 지래울로 184 1층 일부, 3층

【소비자 상담 및 제품문의】 (02)6072-2752, www.sungyi.co.kr

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약, 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패, 오염, 손상된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.
※ 이 약을 사용하기 전에 반드시 본 기재사항을 주의깊게 읽어보시고 본 기재사항은 항상 약과 함께 보관하십시오.
※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223,14-3330)
※ 본 기재사항 최초 제정연월일 이후 변경된 내용은 제품문의 또는 의약품안전나라 의약품 통합정보시스템(https://nedrug.mfds.go.kr)을 통하여 확인할 수 있습니다.

제조번호:

사용기한:

무코팅
38 x 22 mm

최초 제정연월일: 2025.05.09
개정연월일: 2026.09.15[V.02]

플라스틱 HDPE 투명PP 리드지OTHER

8 800724 005822