일반의약품 정보

이 약을 사용(복용)하기 전에 반드시 포장의 기재사항을 확인하세요.

[유효성분] 1정 중

결정트립신(2,500(USP 트립신 단위))(USP) ····· 1mg
브로멜라인(20,000(브로멜라인 단위))(KP) ····· 40mg

[효능·효과] 다음 질환 및 증상의 염증성 부종(부기)의 완화 : 수술 및 외상(상처)후, 유즙울체(젖고임)

[용법·용량] 성인 : 첫날 1회 2정, 1일 4회, 이후 유지량으로 1회 1정, 1일 4회 복용한다. 체내에서의 작용기전은 아직 해명되지 않은 점이 많고 용량, 효과 관계도 밝혀진 것이 아니므로 목적 없이 투여하지 않는다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것. 1) 혈액응고이상 환자 2) 심한 간장애 또는 신장애(신장(콩팥)장애) 환자 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(임신중 투여에 관한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돎)한다고 판단되는 경우에만 투여한다.) 4) 항응고제를 투여하고 있는 환자(병용(함께 복용(사용))투여에 의해, 항응고제의 작용이 증강될 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 신중히 투여한다.) 5) 이 약은 황색4호(타르트라진)을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 과민반응 : 발진, 발적(충혈되어 붉어짐) 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다. 2) 소화기계 : 설사, 변비, 때때로 식욕부진, 배가 거북함, 구역, 구토 등의 증상이 나타날 수 있다. 3) 혈액계 : 드물게 코피, 혈액가래 등의 출혈 경향이 나타날 수 있다.

4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

5. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것. 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 **[사용기한]** 케이스 측면 표시일까지

[포장단위] 20정/상자(10정/PTP x 2) **[성상]** 연노색의 원형 장용성 필름코팅정

[첨가제] ▪ 동물기원: 유당수화물(소, 우유) ▪ 타르색소: 황색203호, 황색4호, 청색1호 ▪ 기타첨가제: 미결정셀룰로오스, **시트르산칼륨**, 크로스포비돈, 경질무수규산, 스테아르산마그네슘, 탭쉘드흰색(11W001), 탭쉘드녹색(39G1596)

[제조자] 성이바이오제약 주식회사
강원특별자치도 원주시 지정면 지래울로 184 1층 일부, 3층
소비자 상담 및 제품문의 : (02)6072-2752, www.sungyi.co.kr
※ 제품개봉시 포장지에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

8 800724 005952

제조번호 :
사용기한 :

48x11mm

일반의약품 약국에서 구입하세요

소염 효소제

브로멜싹 정



부종(부기)의 완화

2가지 복합성분 함유
수술 및 외상 후 고임에

첫날 : 1회 2정, 1일 4회
유지 : 1회 1정, 1일 4회

JEIL 제일헬스사이언스

20정

브로멜싹 정
소염 효소제

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약, 구입 시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변패, 오염, 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
※ 이 약을 사용하기 전에 반드시 본 포장케이스의 기재사항을 주의깊게 읽어보시고 포장케이스를 항상 약과 함께 보관하십시오.
※ 포장케이스 최초 제정연월일 이후 변경된 내용은 제품문의 또는 의약품안전나라 의약품 통합정보시스템(https://nedrug.mfds.go.kr)을 통하여 확인할 수 있습니다. ※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

최초 제정연월일: 2026.01.30
개정연월일: 2026.08.20 [V.01]

SUNGYI BIO Pharm.