

비타민 함유 효과 빠른 몸살약

비타민 C 스트롱

연결캡슐

이 약은 사용하기 전에 반드시 사용설명서를 주의깊게 읽어보시고,
사용설명서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐(1,130 mg) 중
유효성분 : 아세트아미노펜(USP) 500.00 mg
리보플라빈부타레이트(KP) 4.00 mg

첨가제 : 첨가제(동물유래성분) : 젤라틴(돼지, 가축)
기타첨가제 : 공기름, 아자경화유, 레시틴, 황산, 소르비톨 액(비결정성),
농글리세린, 홍화황색소, 락색소, 산화티탄

[성상] 황색의 내용물을 함유한 다홍색의 장방형 연결캡슐

[용법용량] - 만 15세 이상 및 성인 : 1일 3회, 1회 1캡슐
- 복용 간격은 4시간 이상으로 한다.
- 공복(빈 속)시를 피하여 복용한다.

[효능효과] 1) 두통, 치통, 발치(이를 뽑음) 후 통증(통증), 인후(목구멍)통,
귀의 통증, 관절통, 신경통, 요(허리)통, 근육통, 건통(아깨결림), 타박통,
골절통, 염좌통(뺨뚱통), 월경통(생리통), 외상(상처)통의 진통
2) 오한(출고 떨리는 증상), 발열시의 해열

[포장단위] 10 캡슐/상자(10캡슐/PTP×1)

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기간] 제조일로부터 24개월

[소비자상담실] 031-662-1395

[판매원] ㈜셀로마크사이언스(경기도 용인시 기흥구 구성로 357 D동 710호)

[제조원] ㈜셀피타이오(경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7)

※ 자세한 약품 정보는 약약품통합정보시스템
(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국약약품안전관리원
(1644-6223, 14-3330)

※ 유효기간 또는 사용기한이 지난 약품을 사용하지 않도록 주의해
주십시오

※ 구입시 유효기간 또는 사용기한이 지난거나 변질, 변색, 오염되거나
손상된 약품은 구입처를 통해 교환하여 드립니다.

※ 약품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오

[사용상의 주의사항]

1. 경고

- 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진
통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한
사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.
- 아세트아미노펜을 복용한 환자에서 매우 드물게 급성 전신성 발진성
피포증(급성 전신성 발진성 고열물집증)(AGEP), 스티븐스-존슨 증후군(S-
JS), 독성 표피 괴사증(TEN)과 같은 중대한 피부 반응이 보고되었고, 이
러한 중대한 피부반응은 치명적일 수 있다. 따라서 이러한 중대한 피부반응
의 징후에 대하여 환자들에게 충분히 알리고, 이 약 투여 후 피부발진이나
다른 과민반응의 징후가 나타나면 즉시 복용을 중단하도록 하여야 한다.
- 이 약은 아세트아미노펜을 함유하고 있다. 아세트아미노펜으로 일일 최
대 용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 이 약을
일일 최대 용량(4,000mg)을 초과하여 복용하여서는 아니되며, 아세트아
미노펜을 포함하는 다른 제제와 함께 복용하여서는 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감각적 복용시 전신을
일으킨 적이 있는 사람
- 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)
- 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

다른 해열진통제, 감각적, 진정제

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는
영아(갓난아기) 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구토를 수반하는
행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이중후군의 초기
증상일 수 있으므로 의사와 상의할 것.)
- 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르
기성비염(코염), 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고
있는 사람
- 지름기까지 약에 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식,
가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 간장질환, 신장(콩팥)질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 등이
있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 고령자(노인)
- 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부 (임신 30주 이후
살리실산나트륨, 살리살아미드, 아스피린, 아스피린알루미늄,
살리실산콜린, 이부프로펜 성분 함유 제제의 투여가 권고되지 않는다.)
- 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨약, 통풍약, 관절염약,
항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)
- 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나
게양, 출혈문제를 가지고 있는 사람
- 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 제2형 당뇨병 지장대사 이상 환자
또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

- 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타나면 즉시
발진·발적(총혈되어 붉어짐), 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 변비, 어지러움,
부종(부기)
- 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증 증상이 나타나면 경우
1) 속(아나필락시스) : 복통후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함 등과
함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수
있다. 2) 피부정맥만종후군(스티븐스-존슨증후군),
중독성표피괴사증후군(리델증후군) : 고열을 동반하고, 발진·발적(총혈되어
붉어짐), 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나
노출막에 나타날 수 있다. 3) 천식 4) 간기능장애 : 전신의 나른함,
황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨)등이 나타날 수 있다.
5) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

6. 소아에 대한 투여

- 만 2세 미만에게 투여하지 않는다.
- 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다.

7. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 장기간 계속 복용하지 말 것. 3)
복용시에는 음주하지 말 것. 4) 바르비탈계 약물, 심한게 항우울제 및
알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이
감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다. 5)
지반과 피부로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때
혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체내배설이
불충분하다 고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가
다른 정중용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로
혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

8. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것. 2) 적시관선을 피하고 될 수
있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것. 3) 오염(잘못
사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것