

엔비케이제약

2025.04.25

제품명

칼앤디정 설명서

인쇄

양면

재질

모조지70g

도수

1도

사이즈

138×175mm

접지규격

-

칼선(인쇄되지 않습니다.)

담당 디자이너

장수정

기타

-

- 재질 및 색상, 수량 확인해주세요.

- 전화번호, 주소 등 시안 내 중요내용 반드시 확인해주세요.

- 빠진글자(내용), 위치 확인해주세요.

- 같은 데이터라도 인쇄할 때마다 색상차이가 생길 수 있습니다.

색상이 진하고(오차범위 +5~10%)흐림 정도(오차범위-5~10%)로는 재작업이 진행될 수 없습니다. 예)이전 발주는 조금 진하게 인쇄되고 이번 발주는 조금 흐리게 인쇄되었다면 그 편차는 10~20% 정도로 고객님께서 생각하신 것과 다를 수 있습니다.

※상기 사항의 확인 실수로 인한 책임은 당사에 없음을 고지합니다.

유의하시기 바랍니다.

※ 인쇄진행 전 시안 확인을 원칙으로 하며, 고객사에서 시안 승인 후 진행한 인쇄 결과물에 대하여 당사에서는 책임이 없음을 고지합니다. 정확한 검토 부탁드립니다.

일반의약품

칼앤디정

※ 이 약을 사용하기 전에 반드시 첨부문서를 주의깊게 읽어야하며, 첨부문서는 항상 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

[원료약품 및 그 분량] 이 약 1정 중

- 유효성분
시트르산칼슘수화물(USP).....475mg(칼슘으로서 100mg)
농축콜레칼시페롤(EP).....10mg(비타민D로서 1,000IU)
시아노코발라민(USP)..... 1mg
티아민질산염(EP).....10mg
- 첨가제(타르색소) : 청색2호
- 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 콜로이드성이산화규소, 토코페롤아세테이트2배산, 탭실드노란색(11Y824), 포비돈

[성상]

황갈색의 장방형 필름코팅정

[효능·효과]

- 다음 경우의 비타민B₁₂, 비타민D의 보급
 - 육체피로
 - 임신·수유기
 - 병중·병후의 (병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하 시
 - 발육기
 - 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과
 - 뼈, 이의 발육불량
 - 구루병의 예방

[용법·용량]

성인: 1일1회, 1회1정 복용한다.

[사용상주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
 - 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
 - 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 - 만 12개월 미만의 젖먹이
 - 신장결석 환자
 - 심한 증상의 신부전 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것
 - 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계제 제제, 제산제
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자

- 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
 - 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
 - 심장·순환기계기능 장애 환자
 - 신장장애 환자
 - 저단백혈증 환자
 - 강심배당체를 투여중인 환자
 - 신장결석 병력이 있는 환자
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
- 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것
- 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
 - 구역, 구토, 설사, 묽은변, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동 불규칙, 피부발진
 - 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
 - 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
 - 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.
 - 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
 - 우발적으로 과량복용 한 경우
 - 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
- 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
 - 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것
6. 저장상의 주의사항
- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것
 - 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

[저장방법] 밀폐용기. 실온(1-30℃) 보관

[포장단위] 30정/병, 90정/병

[사용기간] 제조일로부터 36개월

[문의전화] 소비자상담실 : 080-957-7190(수신자요금부담)

[제조사] 엔비케이제약㈜ 충남 천안시 동남구 풍세면 풍세로 539

- ※ 본 의약품은 KGMP 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. 본 제품에 이상이 있을 경우 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 의거, 교환 또는 보상 받을 수 있으며, 부작용 피해구제 신청은 한국의약품안전관리원 (1644-6223, 14-3330)에서 할 수 있습니다.
- ※ 본 의약품에 대한 기타 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)의 ‘의약품 등 정보’에서 확인할 수 있습니다.

첨부문서 작성연월일 : 2025.04.25

0A329-00

[제조사]



제품명	종이규격	접지규격	인쇄
칼앤디정	138 × 175mm		☐ 단면 ☒ 양면

- 재질 및 색상, 수량 확인해주세요.
 - 전화번호, 주소 등 중요내용 반드시 확인해주세요.
 - 빠진글자, 틀린글자, 위치 확인해주세요.
 - 같은 데이터라 할지라도 인쇄할 때마다 색상차이가 날 수 있습니다.
 - 색상이 진하고(+5~10%) 흐림 정도(-5%~10%)로는 재작업이 될 수 없습니다.
예를 들면 지난번에는 조금 진하게 인쇄되고 이번에는 조금 흐리게 인쇄되었다면 그 편차는 10%~20%정도로 고객님께서 생각하신 것과 다를 수 있습니다.
- ※상기 사항의 확인 실수로 인한 책임은 당사에 없음을 유의하시기 바랍니다.
- ※고객님께서 승인 후 인쇄 작업이 진행되면 수정이 불가하며, 완성된 제품에 대하여 당사에는 책임이 없음을 고지합니다.