

품명	딥슬링연질캡슐 설명서
규격	110mm x 180mm
형식	양면
코팅	없음
재질	모조 70g
인쇄도수	1도
폰트	세방고딕 / 나눔스퀘어
수정이력	2025.05.28_ 신규



Deep sleep을 위한 선택

딥슬링 연질캡슐

(디펜히드라민염산염)



- [원료약품 및 그 분량]** 1캡슐 중
- 유효성분 : 디펜히드라민염산염(USP) 50mg
 - 첨가제(타르색소) : 청색1호(브릴리안트블루FCF)
 - 첨가제(동물유래) : 젤라틴(기원동물 : 소, 사용부위 : 가죽)
 - 기타 첨가제 : 농글리세린, 소르비톨스페셜글리세린블렌드, 폴리에틸렌글리콜400

[성상] 무색 내지 연한 청록색의 투명한 액상의 내용물을 함유한 연청록색의 불룩한 타원형 연질캡슐(dSL)

[효능 · 효과] 일시적 불면증의 완화

[용법 · 용량]
성인 : 1일 1회 디펜히드라민염산염으로서 50mg을 취침 전 경구투여한다(복용한다).
개인에 따라 디펜히드라민염산염으로서 50mg 복용시 과도한 진정작용이 나타날 경우 25mg을 복용한다.

- [사용상의 주의사항]**
- 1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.**
- 1) 이 약에 과민증이 있는 사람
 - 2) 천식발작, 폐기종, 만성기관지염에 의한 호흡곤란 환자
 - 3) 녹내장 환자
 - 4) 전립선(전립샘)비대 등 하부 요로 폐색(닫혀서 막힘)성 질환 환자
 - 5) 협착(좁아짐)성 소화성 궤양 또는 유문십이지장 폐색(닫혀서 막힘) 환자
 - 6) 15세 미만의 소아
 - 7) 뇌전증 등의 경련성 질환 환자
 - 8) 크론친화성세포종 환자
 - 9) 수유부
 - 10) 일상적으로 불면인 환자
 - 11) 불면증의 진단을 받은 환자

- 2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.**
- 1) 이 약과 동일한 성분을 함유하고 있는 다른 제제
 - 2) 다른 최면진정제, MAO 저해제(억제제), 감기약, 해열진통제, 진해(기침을 그치게 함)·거담약(가래약), 항히스타민제를 함유하고 있는 내복약(비염(코염)용 내복약, 멀미약, 알러지용약)

- 3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.**
- 1) 연용(계속 복용)하거나 장기복용하지 않는다.
 - 2) 졸음을 유발할 수 있으므로 이 약을 복용한 때부터 복용 다음날까지 졸음이 계속되고 나른함을 느끼는 경우에는 이러한 증상이 사라질 때까지 운전 또는 기계조작을 하지 않는다.
 - 3) 이 약을 복용할 때에는 음주를 하지 않는다.

- 4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것.**
- 1) 중증(심한 증상) 근육력증(근육무력증) 환자
 - 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 3) 고령자(노인)
 - 4) 본인 또는 가족이 알러지 체질인 사람
 - 5) 약에 의해 알러지 증상을 일으킨 적이 있는 사람
 - 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 사람(이 약은 임부에 대한 사용경험이 부족하여 안전성·유효성이 확립되어 있지 않으므로 임부에게 투여가 바람직하지 않다)

- 5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.** 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
- 1) 복용 후 다음 증상이 나타나는 경우

신체부위	증상
피부	발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움
소화기	구갈(목마름), 위통, 오심(구역) · 구토, 식욕부진, 설사
정신신경계	어지러움, 두통, 기상시의 두중감(머리무거움), 활동중의 졸음, 불쾌감, 신경과민, 일시적인 의식장해(주의력의 저하, 잠이 덜깨는 증상, 판단력의 저하, 말 · 행동의 이상 등)
기타	심계항진(두근거림), 권태감, 배뇨(소변을 냄)곤란, 시야혼란, 폐쇄각 녹내장




- 2) 2~3회 복용하여도 증상이 나아지지 않는 경우

- 6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항.**
- 1) 용법 용량을 잘 지킨다.
 - 2) 불면증은 심한 질병의 한 증상일 수도 있으므로 이 약을 투여한 후 2주 이상 불면증이 지속될 때에는 의사와 상담한다.

- 7. 저장상의 주의사항.**
- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생 이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관
[포장단위] 10캡슐 / 피티피
[사용(유효)기한] 제조일로부터 24개월(케이스 표시일까지)
[제조자] (주)알피바이오 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7
[제조의뢰 · 판매자] 태극제약(주) 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 123
[소비자상담전화] 080-300-8282

[안전용기 개봉방법]



1. 뒷면 절취선을 따라 지시된
복용량만큼 캡슐제를 잘라냅니다.

2. 캡슐제 뒷면의 표시부분을 잡고
화살표 방향으로 호일을 벗겨냅니다.

3. 뒷면 호일이 벗겨지면 약을 꺼냅니다.

※ 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다.
만약 구입 시 사용(유효)기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를
통하여 교환하여 드립니다.
※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 복용(사용)하지 마십시오.
※ 이 약을 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.
※ 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 의약품
통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>) 및 QR코드를 참조하십시오.

의약품 사용 후 부작용 발생 시, **부작용 신고** 및 **피해구제 신청**은 **한국의약품안전관리원**에 할 수 있습니다.

신청방법 ☎ 1644-6223, 14-3330 | ✉ karp.drugsafe.or.kr

신청대상 의약품 부작용으로 사망, 장애, 질병 피해를 입은 환자 및 유족

모상범위 사망일시보상금, 정례비, 장애일시보상금, 진료비

첨부문서 작성 연월일 : 2025. 05. 28