자재종류 (Meterial Type)	■ 설명서(Leaflet) □ 라벨(Label) □ 지케이스(Carton) □ 외케이스(Outer Case) □ PTP □ Tube		
색상(Color)	PAN 279 C ■ BLACK		
규격(Size)	138mm × 175mm		
Artwork Version	Date	Revision History	
V0421CF	2025.04.21	신제품	
특이사항(Remarks) : 재질 : 모조지 70g / 세로 2단 접지 후 입고(138mm x 44mm)			

비타민D & 칼슘 보급

일반의약품

칼디본정

CalDbon Tab.

분류번호 : 03110

■ **원료약품의 분량** (1정 중)

유효성분 : 시트르산칼슘수화물(U.S.P.) ····· 475mg(칼슘으로서 100mg)
농축콜레칼시페롤(E.P.) ····· 10mg(비타민D로서 1,000IU)
시아노코발라민(U.S.P.) ····· 1mg
티아민질산염(E.P.) ····· 10mg

첨가제(타르색소) : 청색 2호

기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 콜로이드성이산화규소, 탭쉴드노란색(11Y824), 토코페롤아세테이트 2배산, 포비돈

■ **성상**

황갈색의 장방형 필름코팅정

■ **효능 · 효과**

1. 다음 경우의 비타민B_2, 비타민D의 보급
 – 육체피로
 – 임신 · 수유기
 – 병중 · 병후의 (병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하 시
 – 발육기
 – 노년기
2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과
 – 뼈, 이의 발육불량
 – 구루병의 예방

■ **용법 · 용량**

성인 : 1일 1회, 1회 1정 복용한다.

■ **사용상의 주의사항**

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
 1) 고칼슘혈증(hypercalciumia : 혈액 중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
 3) 만 12개월 미만의 젖먹이
 4) 신장결석 환자
 5) 심한 증상의 신부전 환자
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것
 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계계 제제, 제산제
3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것
 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
 ① 비타민D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
 3) 심장 · 순환기계기능 장애 환자
 4) 신장장애 환자
 5) 저단백혈증 환자
 6) 강심배당체를 투여 중인 환자
 7) 신장결석 병력이 있는 환자
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것
 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
 – 구역, 구토, 설사, 묽은 변, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동 불규칙, 피부발진
 2) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B_{12}를 1일 10㎍ 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
 3) 대량 투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
 4) 장기 투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.
 5) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용 투여 시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것
 6) 우발적으로 과량 복용한 경우
 7) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킨다.
 2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용 전후에는 피할 것
6. 저장상의 주의사항
 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것
 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것
 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

■ **포장단위 :** 30, 90정

■ **저장방법 및 사용기간**

밀폐용기, 실온보관(1~30℃), 제조일로부터 36개월

> 만약 구입 시 사용기간이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리겠습니다.

V0421CF

*이 첨부문서 작성일자(2025년 04월 21일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.scd.co.kr)의 '제품안전성정보'에서 확인하실 수 있습니다.

*소비자상담실 : 1522-3846

제조의뢰자
OPTUS | 옵투스제약
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 50

제조자
엔비케이제약(주) NEO BIO KOREA PHARM. CO., LTD.
충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍세로 539

판매자
삼천당제약(주)
경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 71

	Prepared by	Reviewed by	Reviewed by	Reviewed by QA	Approved by
Name	김 민 철	신 용 우	윤 인 아		
Date	2025. 04. 21	2025. 04. 21	2025. 04. 21		