

| 시방서/Spec. |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| 일반/ 전문    |                                 |
| 제품명       | 에드칼큐정                           |
| 자재명       | 에드칼큐정 설명서                       |
| 자재코드      | P294175                         |
| 관리번호      | 102                             |
| 규격        | 138X175(가로X세로)                  |
| 제질(투과)    | 모조지                             |
| 평판        | 70                              |
| 변경사유      | 아이마크 추가                         |
| 비고        | 세로 2단 접지후 입고<br>접지후 규격 : 138X44 |

비타민 B1, D 함유 칼슘제제

에드칼큐정

일반의약품 | 조 제 용

비타민 D 함유 칼슘제제

제품정보 QR코드



이 약을 복용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 약과 함께 보관하십시오.

[원료약품의 분량] 1정 중

유효성분: 시트르산칼슘수화물(USP).....475mg  
(칼슘으로서 100mg)

농축콜레칼시페롤(EP).....10mg  
(비타민D로서 1000I.U)

시아노코발라민(USP).....1mg  
티아민질산염(EP).....10mg

- 첨가제(타르색소): 청색2호
- 기타첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 콜로이드성이산화규소, 토코페롤아세테이트 2배산, 탭철드노란색(11Y824), 포비돈

[성상] 황갈색의 장방형 필름코팅정

[효능·효과]

- 다음 경우의 비타민 B<sub>1</sub>, 비타민D의 보급
  - 육체피로
  - 임신·수유기
  - 병중·병후의 (병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하 시
  - 발육기
  - 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과
  - 뼈, 이의 발육불량
  - 구루병의 예방

[용법·용량]

성인: 1일 1회, 1정 복용합니다.

[사용상의 주의사항]

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
  - 고칼슘혈증(hypercalcaemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis: 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
  - 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
  - 만 12개월 미만의 젖먹이
  - 신장결석 환자
  - 심한 증상의 신부전 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
  - 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계제 제제, 제산제
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의해야 합니다.
  - 의사의 치료를 받고 있는 환자
  - 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부

① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.

3) 심장 · 순환기계기능 장애 환자

4) 신장장애 환자

5) 저단백혈증 환자

6) 강심배당체를 투여중인 환자

7) 신장결석 병력이 있는 환자

**4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의해야 합니다. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지해야 합니다.**

1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.

- 구역, 구토, 설사, 묽은변, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진

2) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적

이상반응이 나타날 수 있습니다.

3) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.

4) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있습니다.

5) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의해야 합니다.

6) 우발적으로 과량복용 한 경우

7) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

**5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항**

1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지켜야 합니다.

2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피해야 합니다.

**6. 저장상의 주의사항**

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관해야 합니다.

3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

**[저장방법]** 밀폐용기, 실온(1~30℃) 보관

**[포장단위]** 30정/병, 90정/병

구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 사용하지 마시고 구입하신 곳에서 교환하십시오.

약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관해야 합니다.

KGMP(우수의약품 제조 및 품질관리기준) 적격업소 제품 ®-등록상표

102

제조의뢰자 :



**종근당**



충청남도 천안시 서북구 성거읍 망향로 797-48

구입처문의 및 소비자상담실 : 080-6776-080(수신자부담)

제조사 : 엔비케이제약㈜

충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍세로 539

※ 제품 사용 후 이상반응(부작용)이 발생한 경우 한국약품안전관리원(1644-6223)에 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

이 첨부문서 작성일자(2025.06.02)이후 변경된 내용은 종근당 인터넷 홈페이지([www.ckdpharm.com](http://www.ckdpharm.com))나 소비자 상담전화(080-6776-080)를 통해 확인할 수 있습니다.