

관리번호	NP25041500 250500
크기	138mm*175mm ->138mm*44mm(세로2단접지)
재질	70g모조지

일반의약품

칼디콤비엔정

(시트르산칼슘수화물/농축콜레칼시페롤
/시아노코발라민/티아민질산염)

NP25041500 | 250500

[원료약품 및 분량 : 이 약 1정 중]

- 유효성분 :
시트르산칼슘수화물(USP) 475mg(칼슘으로서 100mg)
농축콜레칼시페롤(EP) 10mg(비타민D로서 1,000IU)
시아노코발라민(USP) 1mg
티아민질산염(EP) 10mg
- 첨가제(타르색소) : 청색2호
- 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 폴리비드산화규소, 톱칠드노란색(11Y824), 토포페롤아세테이트 2배산, 포비돈

[성상] 황갈색의 장방형 필름코팅정

[효능·효과]

1. 다음 경우의 비타민 B1, 비타민 D의 보급

- 육체피로
- 임신 · 수유기
- 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하
- 발육기
- 노년기

2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다.

- 비타민D(농축콜레칼시페롤):
- 뼈, 이의 발육불량
- 구루병의 예방

[용법·용량] 성인:1일 1회, 1회 1정 복용한다.

[사용상의주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 3) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 4) 신장결석 환자
- 5) 심한 증상의 신부전 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- ① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
- 3) 심장 · 순환기계기능 장애 환자
- 4) 신장장애 환자
- 5) 저단백혈증 환자
- 6) 강심배당체를 투여중인 환자
- 7) 신장결석 병력이 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
- 구역, 구토, 설사, 묽은변, 변비, 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진
- 2) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10μg이상 투여할

경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있다.

3) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.

4) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있다.

5) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.

6) 우발적으로 과량복용 한 경우

7) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킨다.
- 2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1-30℃) 보관

[포장단위] 30 정/병, 90 정/병

[사용(유효)기간] 제조일로부터 36 개월

※ 자세한 품목허가 또는 신고사항은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>) 의약품 등 정보 참조.

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

※ 오용(잘못 사용)을 피하고 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.

※ 본 의약품은 우수약품 제조관리 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 엄격한 제조관리와 품질관리를 거쳐 생산된 의약품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오염 또는 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품 판매업자를 통해 교환하여 드립니다.

♣ 소비자상담실 : 080-388-3333 (수신자부담)

※ 의약품의 정상적인 사용임에도 불구하고, 부작용이 발생하는 경우 부작용 신고 및 피해구제 신청은 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)에 할 수 있습니다.

※ 본 의약품을 사용(복용)하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 항상 본 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.

개정연월일 : 2025년 05월 10일

 **ILHWA**Ph.

• 제조의뢰자 : ㈜일화 / 강원특별자치도 춘천시 동내면 거두단지2길 55

• <https://www.ilhwa.co.kr>

• 제조자 : 엔비케이제약(주) / 충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍세로 539