

간지
285 x 215

290x220x170
e

1개 x 500개



피로회복

피로회복

피로회복

피로회복

피로회복

일반의약품


피로회복

육체피로


체력저하

파워비타에프

정제



1캡슐 × 500개



(01)08806562055029

제조번호 : 2501

사용기한 : 2028년 09월 15일

일반의약품 정보 (계속됨)	
【사용상의 주의사항】	
1. 용고 (1) 일부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선형성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 말 것(비타민 A 과잉증은 원하지는 않음).	(1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 - 구역, 구토, 기어움, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종(부기), 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 붉은 변 (2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 생리 지연될 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. (1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 (2) 만 3개월 미만의 영아 (3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자 (4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자	(3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 항전달관 막힘성 소인이 있는 환자가 비타민 A를 복용할 경우 불임증과 약탈증의 위험이 증가될 수 있다. (4) 장기간 고혈압을 투여할 경우 내성(내성)이 생길 수 있다. (5) 피리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병성 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다. (6) 고혈압 투여에 의해 소혈관 폐쇄를 촉진시키고 당뇨병(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperursemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다. (7) 장기간 고혈압의 비타민 A 시제(카보나트)로부터 전환된 것을 제외한 심취는 폐경기를 지난 여성의 골다공증(뼈상실) 위험을 높일 수 있다. (8) 우발적으로 과량복용 한 경우 (9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. (1) 만 1세 미만의 영아 (2) 의사의 처방을 받고 있는 환자 (3) 고혈압(고혈압) 환자(hypertension : 오장에 과량의 수산염이 배설되는 상태) (4) 일부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 ① 외국에서 임신한 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로 부위 태어난 아이에서 두부신경증 등을 증인으로 하는 기형발생(기형발생) 증가가 추정된다는 역학적사실과가 있으므로 임신 3개월(내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성)에는 비타민 A 결핍증(결핍)에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000 IU/일 미만(미량)에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다. (5) 통풍(통풍) 또는 신장질환(신장질환)이 있는 환자 (6) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 핵산(이차염) 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자	6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 (1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. (2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것. (3) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 IU 이하를 넘지 않도록 한다. (4) 각종 요양사(예: 병원의 간호)를 병행할 수 있다. (5) 용법·용량으로 변하게 하여 임상상(임상)에 영향을 줄 수 있다. (6) 지방과유(지방)를 포함한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질(지질)을 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 과잉(과잉)이 발생하고 있다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 전구체(전구체)를 동시에 투여하고 있다면 이 약 중의 부형제로 존재하여 있는 지질(지질)을 고려하여 그 지질(지질)의 투여량을 감소해야 한다.
5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 이 첨부문서를 소지할 것.	7. 저장상의 주의사항 (1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것. (3) 오용(오용)·오남용(오남용)을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

일반의약품 정보	
【유 효 성 분】 ■ 니코틴아미드(NK) 20mg ■ 리보플라빈(RP) 3mg ■ 아스코르브산(USP) 60mg ■ 티아민질산염(KP) 2mg ■ 레티놀(레티놀) 5mg ■ 토포레콜(레티놀) 10mg ■ 피리독신(PP) 3mg	【저 장 방 법】 차광밀폐용기, 실온(1~30℃) 보관 【사 용 기 한】 (연.월.일) 케이스 측면 표시일까지 【첨 가 제】 ■ 첨가제(동물유래성분) : 속신산칼륨(소, 가축) ■ 기타 첨가제 : 글리콜, 팜유, 백랍, 제시틴, 농글리세린, 소르비톨(비밀정성), 에틸알코올, 적색산화철 【제조(제조)자】 bas khanbio 주주(주주) : 바이오(주주) / 경기도 안성시 함곡면 함곡로 354
【성 상】 황갈색의 유상물질이 든 알약(알약)의 경향(경향)을 띠고 있음	【제 조 자】 다음 경우의 비타민 A, E, B1, B2, B6, C의 보급 - 육체피로 - 임신 · 수유기 - 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력(체력)저하 - 노년기 - 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같다. · 눈의 건조증(건조증) 완화 · 아토피(아토피) 및 알레르기(알레르기) 증상의 증상 · 작용(작용) : 2025. 09. 11 (Rev.0)