



모발 손발톱 성장장애 개선

판비오틴^(비오틴) 정

BOTH-001

[원료약품 및 그 분량] 1정(120.0mg) 중,

- 유효성분: 비오틴(USP) 5.00mg
- 첨가제(동물유래성분): 유당수화물(소·우유)
- 기타첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 콜로이드알리콘디옥사이드

[성 상] 흰색의 원형 정제

[효능·효과] 비오틴 결핍으로 인한 손·발톱 또는 모발 성장 장애

[용법·용량] 1일 1회 1정, 식사전 복용

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
- 2) 3개월 미만의 영아(간·난아기)
- 3) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용(사용)하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것

- 1) 날계란 흰자와 비오틴이 비가역적이며 약효가 없는 복합체를 형성하므로 날계란과 비오틴을 동시에 복용하지 않는다.

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 1) 임부, 수유부: 임신부·수유부가 복용한 경우에 대한 임상 연구는 제시되어 있지 않다. 또한 임신, 태아의 발달 단계, 태반의 발달 및 출생 후 과정에 미치는 영향에 관한 동물 연구도 충분히 이루어지지 않았다. 지금까지 임신부 복용에 있어서의 부정적인 영향에 대하여 알려진 바는 없지만 임신 중의 복용은 신중하게 이루어져야 한다. 또한 작용물질은 모두로 분비된다.
- 2) 항경련제 복용환자: 카르바마제핀, 페니토인, 페노바르비탈이 비오틴의 대사를 증가하여, 오랫동안 지속되는 항경련제 투여로 비오틴의 혈중농도 감소가 발생된다.
- 3) 항생제 복용환자: 항생제의 사용은 대장에 있는 박테리아에 의해 생성되는 비오틴을 감소시킬 수 있다.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

- 1) 두드러기, 위장장애

5. 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것

6. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 소아의 손에 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관한다.
- 3) 오염을 피하고 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.

[포장단위] 30정/상자(10정/PTP x 3), 90정/상자(30정/10정/PTP x 3) x 3 [저장방법] 기밀용기, 실온보관(1~30°C)

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다. 만약, 구입 시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질·변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.

※ 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 부작용 피해구제 신청: 한국약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

※ 가장 최근 개정된 제품설명서의 내용 등 본 제품에 대한 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>) 또는 당사 홈페이지(<http://www.dkpharm.co.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 제품에 관한 의문사항은 동국제약(주) 소비자상담실 ☎080-550-7575: 수신자 요금 부담)로 문의 주십시오.

• 제조의뢰자: 동국제약(주) 충청북도 진천군 광혜원면 용소2길 33-19

• 제조자: 동성제약(주) 충청남도 아산시 둔포면 관대안길 45

설명서 최종 개정 연월일: 2025.06.09