

미피드 서방정 150밀리그램 (레바미피드)

MPS 2025.05.29-00

전문의약품

미피드 서방정 150mg (레바미피드)

Mipide SR Tab. 150mg

【원료약품 및 그 분량】1정 중
■ 유효성분: 레바미피드(JP) 150.0mg
■ 기타 첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 이소말트, 폴리이드 성이산화규소, 히프르멜로오스, 히드록시프로필셀룰로오스

【성 상】
흰색의 원형 서방정

【효능·효과】
다음 질환의 위점막병변(미란, 출혈, 발적, 부종)의 개선: 급성위염, 만성위염의 급성악화기

【용법·용량】
성인 1 일 2 회, 아침 저녁으로 1 회 1 정씩 복용 이 약을 통째로 삼켜야 하며, 나누어 복용하거나 씹으면 안된다.

【사용상의 주의사항】
1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
1) 이 약 성분에 과민반응 병력 환자
2. 이상반응
1) 이 약에서 보고된 이상반응
이 약에 대한 안전성은 급성 또는 만성 위염 환자를 대상으로 2주간의 무작위배정, 이중눈가림, 활성대조(대조약: 레바미피드 속방정) 임상시험 (n= 470)에서 평가되었다.
이상반응은 이 약 투여군에서 24명(10.17%), 대조약 투여군에서 20명 (8.55%)에서 발생하였다.
가장 빈번하게 발생한 이상반응은 이 약 투여군에서 위장관계 장애 5명 (2.12%), 감염 및 기생 4명(1.69%), 근육격계 및 결합조직 장애 3명 (1.27%) 이었으며, 대조약 투여군에서는 감염 및 기생 6명(2.56%), 위장 관계 장애 5명(2.14%)이었다.
이상반응 중 임상시험용의약품과 인과관계가 있는 것으로 판단된 약물 이상반응(ADR)은 이 약 투여군에서 17명(7.2%), 대조약 투여군에서 12 명(5.13%) 발생하였다.
가장 빈번하게 발생한 약물이상반응은 이 약 투여군에서는 위장관계 장애 4명(1.69%), 대조약 투여군에서는 위장관계 장애 3명(1.28%)이었다. 두 치료군에서 가장 빈번하게 발생한 약물이상반응인 위장관계 장애의 중증도는 모두 경중이었다.
두 치료군에서 중대한 이상반응은 발생하지 않았다. 영구 투여중단을 초래한 약물이상반응은 대조약 투여군에서 어지러움 1건(0.42%)이 보고 되었다.
【표】 임상시험에서 보고된 약물이상반응

	이 약 투여군 (n=236) n(%)	대조약 투여군 (n=234) n(%)
위장관계 장애		
구역	3(1.27)	0
복부팽만	0	1(0.43)
상복부 통증	0	1(0.43)
변비	0	1(0.43)
설사	0	1(0.43)
소화불량	1(0.42)	0
감염 및 기생		

비인두염	1(0.42)	1(0.43)
부고환염	0	1(0.43)
인두편도염	1(0.42)	0
근골격계 및 결합조직 장애		
근육통	2(0.85)	1(0.43)
관절통	0	1(0.43)
신경계 장애		
어지러움	1(0.42)	1(0.43)
두통	1(0.42)	1(0.43)
피부 및 피하조직 장애		
피부 건조	0	1(0.43)
습진	1(0.42)	0
소양증	0	1(0.43)
실혈실험 검사		
혈중 크레아틴키나아제 상승	2(0.85)	0
정신적 장애		
우울증	0	1(0.43)
불면증	1(0.42)	0
호흡기계, 흉부 및 종격동 장애		
기침	0	1(0.43)
구강 인두 통증	1(0.42)	0
혈액계 및 림프계 장애		
백혈구감소증	0	1(0.43)
심장 장애		
심계항진	0	1(0.43)
전신 장애 및 투여부위 상태		
홍통	1(0.42)	0
양성 산생물, 비특이적 악성 종양		
혈관종	1(0.42)	0
생식기계 및 유방 장애		
양성 전립선비대증	0	1(0.43)

2) 레바미피드 속방정에서 보고된 이상반응
여기서 '드물게'는 0.1 %미만을, '때때로'는 0.1 ~ 5 %미만을, 아무런 표현이 없는 것은 5 %이상 또는 빈도불명을 의미함
(1) 중대한 이상반응
① 소크, 아나필락시스모양 증상(빈도불명) : 소크, 아나필락시스모양 증상이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
② 백혈구 감소(드물게), 혈소판 감소(빈도불명) : 백혈구 감소, 혈소판 감소가 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
③ 간기능장애(드물게), 황달(빈도불명) : AST, ALT, γ-GTP, ALP 상승 등을 수반하는 간기능장애, 황달이 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
(2) 기타 이상반응
① 과민반응 : 두드러기, 드물게 발진, 가려움, 약진양 습진 등의 과민반응이 나타날 수 있으므로 이와 같은 경우에는 투여를 중지한다.

- ② 정신신경계 : 마비, 어지럼, 졸음이 나타날 수 있다.
- ③ 소화기계 : 구갈, 드물게 변비, 복부팽만감, 설사, 구역, 구토, 속쓰림, 복통, 트림, 미각이상 등이 나타날 수 있다.
- ④ 간 : 드물게 AST, ALT, γ-GTP, ALP 상승 등 아미노전달효소가 현저히 상승한 경우나 발열, 발진 등이 동시에 나타난 경우는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- ⑤ 혈액계 : 혈소판 감소, 때때로 백혈구 분획증, 분엽핵구의 감소, 림프구의 상승, 드물게 백혈구 감소, 과립구 감소가 나타날 수 있다.
- ⑥ 기타 : 유선종창, 유방통, 여성형 유방, 유즙분비 유발, 심계항진, 발열, 안면홍조, 혀의 마비, 기침, 호흡곤란, 탈모 또는 드물게 월경이상, BUN 상승, 부종, 인두부 이물감 등이 나타날 수 있다.

- 3. 임부 및 수유부에 대한 투여
1) 임신중의 투여에 관한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에게는 치료상의 유약성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
2) 동물실험에서 모유중으로 이행하는 것이 보고되어 있으므로 수유부에게 투여하는 경우에는 수유를 피한다.
- 4. 소아 및 청소년에 대한 투여
저체중출생아, 신생아, 유아, 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다(사용경험이 적다.).
- 5. 고령자에 대한 투여
고령자에 있어서 확인된 이상반응 종류 및 이상반응 발현율은 비교령자와 비교시 차이가 없으나, 일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 소화기 증상 등의 이상반응에 주의한다.
- 6. 보관 및 취급상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.
- 7. 의약품동등성시험 정보
시험약 미피드서방정150밀리그램(레바미피드)〔(주)팜젠사이언스〕와 대조약 레코미드서방정150밀리그램(레바미피드)〔(주)유한양행〕을 2×2 교차시험으로 각 1정씩 건강한 성인에게 공복 및 식후 시 단위 경구 투여하여 58명(공복) 및 41명(식후)의 혈중 레바미피드를 측정한 결과, 비교평가항목치(AUC, C_{max})를 로그변환하여 통계처리하였을 때, 기하평균비율의 90% 신뢰구간이 80.00~125.00% 이내로서 생물학적으로 동등함을 입증하였다.
<공복>

구분		비교평가항목		참고평가항목	
		AUC _{0~24hr} (ng · hr/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)
대조약	레코미드서방정 150밀리그램 (레바미피드) [(주)유한양행]	876.8± 244.7	194.0± 75.6	3.75 (1.00~ 6.00)	5.24± 4.05
	미피드서방정 150밀리그램 (레바미피드) [(주)팜젠사이언스]	935.8± 299.4	222.9± 92.0	3.25 (1.00~ 6.00)	5.70± 4.35
기하평균비율의 90%신뢰구간 (기준: 80.00 ~ 125.00%)		98.59 ~ 112.73%	104.75 ~ 123.95%	-	-
(AUC, C _{max} , t _{1/2} ; 평균값±표준편차, T _{max} ; 중앙값(범위), n = 58)					

(AUC, C_{max}, t_{1/2} ; 평균값±표준편차, T_{max} ; 중앙값(범위), n = 58)

AUC_i : 투약시간부터 최종혈중농도 정량시간 i까지의 혈중농도-시간곡선하면적
C_{max} : 최고혈중농도
T_{max} : 최고혈중농도 도달시간
t_{1/2} : 말단 소실 반감기
<식후>

구분	비교평가항목		참고평가항목	
	AUC _{0~24hr} (ng · hr/mL)	C _{max} (ng/mL)	T _{max} (hr)	t _{1/2} (hr)

대조약	레코미드서방정 150밀리그램 (레바미피드) 〔(주)유한양행〕	752.9± 157.9	162.7± 57.1	4.00 (2.00~ 7.00)	5.55± 4.13
시험약	미피드서방정 150밀리그램 (레바미피드) 〔(주)팜젠사이언스〕	777.9± 177.4	180.1± 53.7	4.00 (2.00~ 8.00)	4.32± 1.95
기하평균비율의 90%신뢰구간 (기준: 80.00 ~ 125.00%)		98.94 ~ 107.43%	104.82 ~ 119.00%	-	-

(AUC, C_{max}, t_{1/2} ; 평균값±표준편차, T_{max} ; 중앙값(범위), n = 41)

AUC_i : 투약시간부터 최종혈중농도 정량시간 i까지의 혈중농도-시간곡선하면적
C_{max} : 최고혈중농도
T_{max} : 최고혈중농도 도달시간
t_{1/2} : 말단 소실 반감기

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 30정/병, 300정/병

【제조자】 (주)팜젠사이언스 (경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50)

- ◆ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 본 제품을 구입시 유효기한 또는 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손되었을 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환해 드립니다.
- ◆ 이 설명서의 개정일자 2025년 05월 29일 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.pharmgenscience.com) 또는 소비자상담실(02-2194-3500)에서 확인할 수 있습니다.
- ◆ 의약품안전나라(https://nedrug.mfds.go.kr)의약품 정보를 참조하십시오.
- ◆ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국 의약품안전관리원 (1644-6223, 14-3330)

의사나 약사의 지시에 따라 사용하십시오.


www.pharmgenscience.com

경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50
(소비자상담실) 02-2194-3500

스티커 / 설명서 제작업체

자재코드	703547
자재명	미피드서방정150밀리그램 설명서
규격(Size)	35 × 35 mm (매뉴얼팩)
폴림방향 (일반설명서의 경우, 설명서 접지 여부)	두출
비고란 추가 기재 여부 (첨가제 사용상의 주의사항 해당 여부)	N/A
제조처	무궁화엘앤비
개정사항	제정

>> 접지 후 모습



날짜	2025년 5월 29일	기타	론타입	●재질 및 색상, 수량 확인해주세요. ●전화번호, 주소 등 시간 내 중요내용 반드시 확인해주세요. ●빠진글자(내용), 틀린글자(내용), 위치 확인해주세요. ●같은 데이터라도 인쇄할 때마다 색상차이가 생길 수 있습니다. 색상이 진하고(오차범위 +5~10%) 흐림 정도(오차범위 -5~10%)로는 재작업이 진행될 수 없습니다. 예) 이전 발주는 조금 진하게 인쇄되고 이번 발주는 조금 흐리게 인쇄되었다면 그 편차는 10~20% 정도로 고객님의게서 생각하신 것과 다를 수 있습니다. ※ 상기 사항의 확인 실수로 인한 책임은 당사에 없음을 고지합니다. 유의하시기 바랍니다. ※ 수정된 원본 데이터는 제공되지 않습니다.
고객사	팜젠사이언스	색상	맥색(K100) —— 칼선(인쇄되지 않습니다.)	
제품명	미피드서방정150밀리그램			
유형	매뉴얼팩			
인쇄	㉞양면 ㉞단면			
규격	138×210mm	폰트	- 제품명 : 7포인트 이상 - 전문의약품 문구 : 7포인트 이상 - 본문 : 6포인트	
접지규격	35×35mm			
재질	캠퍼스지 50g			
관리번호	MPS 2025.05.29-00			

※ 인쇄진행 전 시안 확인을 원칙으로 하며, 고객사에서 시안 승인 후 진행한 인쇄 결과물에 대하여 당사에는 책임이 없음을 고지합니다. 정확한 검토 부탁드립니다.