

분류번호 일반의약품
316 **조제용**

레날비타정

(Renalvita Tab.)

1000정

WS Medical Co., Ltd
더블유에스메디칼(주)

【원료약품 및 분량】 1정 중

- 유효성분 : 피리독신염산염(KP) 10mg, 티아민질산염(KP) 1.5mg, 시아노코발라민1000배산(시아노코발라민으로서 6 μ g)(KP) 6mg, 리보플라빈(KP) 1.7mg, 아스코르브산97%과립(아스코르브산으로서 60mg)(별규) 61.86mg, 폴산(KP) 1mg, D-비오틴(USP) 0.3mg, 니코틴산아미드(KP) 20mg, 판토텐산칼슘(KP) 10mg
- 첨가제(타르색소) : 황색5호, 황색203호 ■ 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 경질무수규산, 크로스포비돈, 경질무수규산, 스테아르산마그네슘, 탭실드흰색(91W243), 탭실드노란색(29Y1635)

【성 상】 노란색의 원형 필름코팅정 【용법·용량】 성인 1일 1회 1정 복용한다.

【효능·효과】 ○ 다음 경우의 B₁, B₂, B₆, C 의 보급 - 육체피로 - 임신 수유기 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하시

【사용상주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 2) 만 3개월 미만의 젖먹이 2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. 레보도파 3. 다음과 같은 사람(경우는 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태) 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아 4) 통풍환자 또는 신장(콩팥) 결석이 있는 환자 5) 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다. 6) 이 약은 황색203호(퀴놀린옐로우 WS, Quinoline Yellow WS)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다. 4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지 하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서(본 기재사항을 소지할 것. 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 설사, 묽은변 2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다. 3) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g 의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다. 4) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 μ g 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다. 5) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(요산과다증)(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.

6) 우발적으로 과량 복용 한 경우 7) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우 5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다. 3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다. 6. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관 【사용기간】 제조일로부터 36개월 【포장단위】 500 정/병, 1000 정/병, 30 정/병(30정/병/상자), 60 정/병(60정/병/상자), 90 정/병(90정/병/상자), 100 정/피티피(10정/PTP*10)

【제 조 자】 **SUNGI** 성이바이오제약 주식회사
BIO Pharm.

강원특별자치도 원주시 지정면 지래울로 184 1층 일부, 3층

【판 매 자】 더블유에스메디칼(주) 서울특별시 영등포구 선유로 9, 409호(문래동5가, 유니온빌딩)

【제품문의】 02-3413-3358, www.sungi.co.kr

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 펼친 제품입니다. 만약, 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패, 오염, 손상된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다. ※ 이 약을 사용하기 전에 반드시 본 기재사항을 주의깊게 읽어보시고 본 기재사항을 항상 약과 함께 보관하십시오. ※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국 의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330) ※ 본 기재사항 제정연월일 이후 변경된 내용은 제품문의 또는 의약품안전나라 의약품 통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 통하여 확인할 수 있습니다.

이 약은 습기에 약하므로 보관 및 조제시 주의하시기 바랍니다.

최초 제정연월일 : 2025.10.23

개정연월일 : 2025.12.24[V.01]



HDPE

투명-PP

리드자: OTHER



제조번호:

무코팅

사용기한:

35 x 22 mm