

140 x 200

일반의약품 조제용

K G M P
우수의약품지정업체

콘드인정

■ 원료약품 및 분량 1정 중

- 유효성분 : 콘드로이틴설페이트나트륨(KP) 400밀리그램, 티아민질산염(KP) 25밀리그램, 토코페롤아세테이트 2배산(KP) 20밀리그램(비타민E(으)로서 10 아이.유), 산화마그네슘(KP) 20밀리그램(마그네슘(으)로서 12.1 밀리그램)
- 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유), 콘드로이틴설페이트나트륨(소, 연골)
- 기타첨가제 : 경질무수규산, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 톱실드갈색(29B1093)

■ 성상

갈색의 타원형 필름코팅정

■ 효능·효과

○ 다음 경우의 비타민 B1, E의 보급

- 육체 피로
- 임신·수유기
- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력 저하 시
- 노년기

○ 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.

- 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등)
- 각기
- 눈의 피로

■ 용법·용량

만 19세 이상 성인 : 1일 2회, 1회 1정 복용한다

■ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구(먹는, 복용하는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- 3) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 4) 신장(콩팥)장애 환자
- 5) 저단백혈증 환자
- 6) 임부

7) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 헤장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 구역, 구토, 묽은 변, 붉은 반점, 수전부축(심장박동정지), 중추신경계 기증저하, 식욕부진, 홍반, 두드러기, 습진, 반구진성 발진, 가려움, 부종(부기), 부종·수분저류(신부전 또는 심부전 환자)
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
- 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
- 4) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 5) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여 시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
- 6) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 7) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것
- 3) 일반적 주의 : 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

■ 저장방법·사용기간 밀폐용기, 실온(1 ~ 30℃) 보관, 제조일로부터 36개월

■ 포장단위 100정/병

■ 제조의뢰자·판매원 한국프라임제약(주) - 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단9로 100

■ 제조자 메디스제약(주) - 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단6로 170

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 한 제품입니다. 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- 개정일자 이후 변경된 내용은 식약처 의약품통합정보시스템 (<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.
- 의약품 부작용 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223 또는 14-3330)

소비자상담실 080-700-0052 / <http://www.koreaprime.co.kr>

개정일자: 2025.06.27(Rev.01)

 **한국프라임제약**