

조제용

일반의약품

다비슬림^정

변비치료제

20mm

20mm

※ 문안작성일 : 2025.06.23 (Rev.0)

조제용

일반의약품

다비슬림^정

변비치료제

[원료약품 및 분량] 1정 중

· 유효성분 : 비사코딜(KP) 3mg

도큐세이트나트륨(USP) 16.75mg

· 첨가제(타르색소) : 청색1호알루미눔레이크, 황색203호알루미눔레이크

· 첨가제(동물유래) : 유당수화물(기원동물 : 소, 사용부위 : 우유)

· 기타첨가제 : 옥수수전분, 미결정셀룰로오스, 하이드록시프로필셀룰로오스, 저치환도하이드록시프로필셀룰로오스, 경질무수규산, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 스테아르산마그네슘, 탈크, 히프로멜로오스프탈레이트, 폴리에틸렌글리콜6000, 산화티탄

[성상]

연두색의 원형 장용필름코팅정

[효능·효과]

· 변비

· 변비에 따른 다음 증상의 완화 : 식욕부진(식욕감퇴), 복부(배부분)팽만, 장내이상발효, 치질

[용법·용량]

만 15세 이상 : 1회 1~2정, 1일 3회 식후에 복용

복용간격은 4시간 이상으로 합니다. 다만, 초회(처음)는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량(양을 늘림) 또는 감량(줄임)합니다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

1) 급성 복부(배부분)질환(충수염, 장출혈, 궤양성 결장염 등) 환자

2) 장폐색(창자막힘) 환자

3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약(식품)을 복용하지 마십시오.

: 제산제 또는 우유 섭취 후 1시간 이내.

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오.

1) 심한 복통(배 아픔) 또는 구역, 구토 환자

2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성

3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람

4) 나트륨 제한식이를 하고 있는 사람

5) 직장의 출혈 혹은 장부전의 병력이 있는 사람

6) 이 약은 황색203호(퀴놀린옐로우 WS, Quinoline Yellow WS)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것.

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

1) 이 약을 복용함으로써 발진·충혈되어 붉어짐, 가려움, 심한 복통(배 아픔), 설사, 구토 등이 나타날 경우

2) 이 약을 복용함으로써 복부(배부분)불쾌감, 경련이 일어날 경우.

3) 1주 정도 투여하여도 변비의 개선이 없을 경우.

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지켜십시오.

2) 반드시 필요한 경우 이외에는 만 10세 이하의 어린이는 복용을 피하는 것이 바람직합니다.

3) 복용 시 정제를 씹지 마십시오.

4) 장기간 계속 사용시 약물에 대한 내성이 증가하고 변비가 악화될 수 있으므로 1주일 이상 계속 사용해서는 안됩니다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 변비의 원인을 조사하십시오.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관하십시오.

3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[저장방법] 기밀용기, 실온보관(1~30 ℃)

[포장단위] 500정/병

※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과하였거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, "소비자 피해보상규정"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 의약품 부작용 피해구제신청은 한국 의약품안전관리원(1644-6223)에 할 수 있습니다.

※ 어린이 손에 닿지 않는 장소에 보관합니다.

※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.

※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.

※ 작성일자 이후 변경된 내용은 의약품안전나라(nedrug.mfds.go.kr) 또는 031)314-0329(소비자상담실)에서 확인할 수 있습니다.

[제조외뢰 및 판매자] (주)씨엠지제약 / 경기도 시흥시 공단1대로27번길 27

※ 문안작성일 : 2025.06.23(Rev.0)

[제조자] (주)바이넥스 / 부산광역시 사하구 다대로 368-3

>> 접지 후 모습

• 롤 폴림방향 (봉인반대방향)

프로젝트 시방서	
자재명	다비슬림정
규격(장폭고/두께)(mm)	138x280mm(접지규격 35x35mm)
인쇄도수	K100
용지/코팅/후가공	캠퍼스지 50g
CMG제약	