

KGMP 적격업체제품

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것
 - 1) 이 약의 성분 및 다른 H2 수용체 길항제에 과민증의 병력이 있는 환자
 - 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수 장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것
 - 1) 음식을 삼키기 어렵거나 삼킬 때 통증이 있는 경우 및 토혈(혈액구토)이나 혈변이 있는 경우
 - 2) 속쓰림 증상이 3개월 이상 지속된 경우
 - 3) 현기증(어지러움) 또는 졸림, 식은땀이 함께 나타나는 경우
 - 4) 짧은 호흡과 함께 가슴 또는 어깨 통증을 동반하는 경우
 - 5) 가슴통증이 빈번히 나타나는 경우
 - 6) 예상치 않은 체중감소, 오심(구역), 구토, 위장관 통증 등의 증상이 나타나는 경우
 - 7) 비스테로이드성 소염(항염)진통제를 복용하고 있는 경우
 - 8) 약물들에 대한 과민증의 병력이 있는 환자
 - 9) 신장에(신장장애) 환자(혈중 농도가 증가될 수 있다)
 - 10) 심질환 환자(심혈관계의 이상반응을 일으킬 수 있다)
 - 11) 간장애 환자(증상이 악화될 수 있다)
 - 12) 고령자(노인)
 - 13) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 (임신증의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다.)
 - 14) 수유부 (모유 중으로의 이행이 보고되어 있다.)
3. 다음의 약물을 복용하는 경우 :
 - ① 무충치로제 및 항진균제(이 약의 위산분비 억제작용이 아졸계 항진균(곰팡이)약(예, 이트라코나졸 및 포사코나졸 경구현탁액)의 경우효능을 저하시킨다.)
 - ② 티로신 키나제 억제제(TKIs), 다사티닙, 엘로티닙, 게피티닙, 파조파닙: TKIs의 혈당농도를 감소시켜 효능을 저하시킨다.
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것
 - 1) 증상이 지속되거나 악화되는 경우
 - 2) 이 약은 14일 이상 복용하지 않는다.
 - 3) 이 약의 복용으로 아래와 같은 이상반응이 보고되었으므로, 이러한 증상이 나타나는 경우 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의한다.
 - ① 과민증: 속, 아나필락시스, 호흡곤란, 전신홍조(온몸이 붉어짐), 안면부종(얼굴부기), 인두부종(부기), 두드러기 등

- ② 혈액: 백혈구 감소, 적혈구 감소, 혈소판감소(지혈지연과 동일한 의미), 호산구감소, 빈혈, 지혈지연(전신권태감, 무력, 피하(피부밑)점막하 출혈, 발열)
- ③ 피부: 피부점막안증후군, 표피괴사증, 발진, 두드러기(홍반)
- ④ 간: 간기능 이상, AST(GOT)·ALT(GPT) 등의 상승, 총빌리루민·LDH 상승, 황달, 간염
- ⑤ 근육계: 근육통, 횡문근융해증(횡문근용해), 관절통, 근육경련
- ⑥ 순환기계: 사맥(느린맥), 빈맥(빠른맥), 가슴 통증, 혈압상승, 안면홍조, 이명(귀울림)
- ⑦ 정신신경계: 의식장애, 경련, 전신권태감, 두통, 졸음, 불면, 환각, 초조, 흥분, 성욕감퇴, 감각이상, 두중감(머리무거움), 혼돈, 우울, 어지러움
- ⑧ 소화기계: 변비, 설사, 구갈, 구역구토, 복부(배부분)팽만감, 식욕부진, 구내염(입안염)
- ⑨ 비뇨생식계: 간질성 신염(신장염), 급성 신부전, 발열, 신기능 검사치 이상(BUN·크레아티닌 상승 등), 월경불순
- ⑩ 호흡기계: 고열, 기침, 호흡곤란 및 흉부 X-ray 이상을 동반한 간질성 폐렴, 기관지경련
- ⑪ 기타: 여성형유방, 미각이상
4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
- 1) 이 약의 투여로 위암에 의한 증상이 은폐될 수 있으므로 증상완화 목적으로 일시적으로만 사용한다.
- 2) 알코올이 함유된 음료와 복용하지 않도록 한다.
- 3) 이 약을 투여 후 투약 전과 신체 기능에 변화가 있는 경우 의사 또는 약사와 상담한다.
- 4) 혈액투석환자에게 이 약과 인산염 결합제를 병용할 경우 탄산칼슘 효능 손실 위험이 발생할 수 있다.
5. 저장상의 주의사항
- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기한】 케이스 표시일까지

【포장단위】 30정/상자(10정/PTP×3)

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서 작성일(2025.06.17) 이후 변경된 내용은 홈페이지 <https://jeyak.co.kr>이나 소비자 상담실로 문의 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>) 참조하십시오.

※ 부작용보고 및 피해구제신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)



오스틴제약(주)

경기도 안산시 단원구 성곡로 146번길 20
소비자상담실: 080-010-5510