

프로젝트 시방서

자재명	쿠비트연질캡슐
규격(장폭고/두께)(mm)	180x200mm
인쇄도수	먹1도
용지/코팅/후가공	모조지70g

CMG 제약

CMG 제약



전립선비대에 의한 배뇨증상 개선

쿠비트

연질캡슐

쿠쿠르비트중자유엑스(15~25→1)

일반의약품

[원료약품 및 분량] 1캡슐 중

- 유효성분 : 쿠쿠르비트중자유 엑스(15~25:1)(별규) 500mg
- 첨가제(동물유래) : 숙산산젤라틴(기원동물 : 돼지, 사용부위 : 가죽)
- 기타첨가제 : 농글리세린, 비결정성소르비톨액, 에틸바닐린, 카카오색소, 산화티탄

[성상]

진녹색의 유상액이 든 암갈색의 타원형 연질캡슐

[효능 · 효과]

1. 잔뇨감(소변을 누고난 후에도 다 눈 것 같지 않은 느낌)은 없으나 야뇨, 빈뇨 증상 및 요배출량이 감소(초당 10 mL ~ 15 mL 사이)한 전립샘 비대에 의한 배뇨(소변을 누)장애
2. 잔뇨감(소변을 누고난 후에도 다 눈 것 같지 않은 느낌)(50 mL 전후)이 있고 야뇨, 빈뇨 증상 및 요배출량이 감소(초당 10 mL 이하)한 전립샘 비대에 의한 배뇨(소변을 누)장애

[용법 · 용량]

성인 : 쿠쿠르비트중자유엑스로서 1회 500 mg을 1일 2회, 물과 함께 식전에 복용합니다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

이 약(호박성분)이나 이 약의 구성성분에 과민반응 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

당성분(말티톨, 소르비톨) 소화에 장애가 있는 환자(이 약은 소르비톨을 함유하고 있으므로 특정 당성분을 소화하기 어려운 환자)

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약을 사용한 경험이 있는 2,245명을 후향적으로 조사한 결과 속쓰림, 위통, 구역 등의 위장장애가 나타났습니다.
- 2) 알파차단제와 병용(함께 복용)한 환자에서 혈압저하, 피부반응, 어지럼 등이 보고되었습니다.
- 3) 이 약을 포함한 다른 유사 약물에서 드물게 구역, 구토 등의 증상이 나타났습니다.
- 4) 과량 복용 시 강한 신경과민 반응이 나타날 수 있습니다.
- 5) 매우 드물게 가려움, 발진(두드러기), 얼굴부종(부기), 호흡곤란(알레르기성 혈관부종(부기))이 나타날 수 있습니다.
- 6) 1일 10 g 이상 복용하는 경우 경증의 설사가 나타날 수 있습니다(소르비톨 함유 제제).

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 이 약은 대증요법(증상별로 치료하는 방법)제로서 전립샘 비대증을 근본적으로 치료하지 못하므로 증상이 개선되지 않거나 악화되면 반드시 의사의 진찰을 받으십시오.
- 2) 투여 간격을 지키지 못한 경우에도 2회 투여량을 일시에 복용하지 마십시오.
- 3) 혈뇨나 급성 치질 증상이 나타나는 경우에는 반드시 의사의 진찰을 받으십시오.
- 4) 이 약과 음식물과의 상호작용은 알려지지 않았습니다.
- 5) 이 약과 다른 약물과의 상호작용은 알려지지 않았으나 다른 약물과 복용 시 반드시 의사 또는 약사와 상의하십시오.
- 6) 이 약의 복용과 운전 등의 기계조작과의 연관성은 알려지지 않았습니다.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 25 ℃ 이하에서 직사광선을 피해 습기가 적고 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오염(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오

[저장방법] 기밀용기, 상온(15~25℃)이하 보관

[포장단위] 60캡슐/피티피(10캡슐/PTP X 6)

- ※ 본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 경과하였거나 변질 · 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, "소비자 피해보상규정"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.
- ※ 의약품 부작용 피해구제신청은 한국약품안전관리원(1644-6223)에 할 수 있습니다.
- ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다.
- ※ 작성일자 이후 변경된 내용은 의약품안전나라(nedrug.mfds.go.kr) 또는 031)314-0329(소비자상담실)에서 확인할 수 있습니다.

문안작성일 : 2025. 08. 22 (Rev.0)

[제조의뢰 및 판매자] (주)씨엠피제약 / 경기도 시흥시 공단1대로27번길 27

[제조자] 코스맥스파마(주) / 충청북도 제천시 바이오밸리3로 30 일부