

벨리라이트 정

BELLYLIGHT TABLET

【원료약품의 분량】 1정(685 밀리그램) 중

- 유효성분 : 수산화마그네슘(KP) 500mg
- 유효성분 : 우르소데옥시콜산(KP) 10mg
- 유효성분 : 노회엑스(BP) 100mg
(히드록시안트라센유도체(바발로인)으로서 20,0mg)
- 첨가제(동물유래) : 스테아르산마그네슘(기원동물:소, 사용부위:우지)
- 기타첨가제 : 전분글리콜산나트륨, 탭실드흰색(11W1554), 히드록시프로필셀룰로오스

【성 상】

흰색의 타원형 필름코팅정

【효능·효과】

변비, 변비에 따른 다음 증상의 완화 : 식욕부진(식욕감퇴), 복부팽만, 장내이상발효, 치질

【용법·용량】

만 15세 이상 및 성인 : 1회 1~2정, 1일 2회 아침, 저녁 공복시(식전 또는 식간)에 복용한다.
복용간격은 4시간 이상으로 한다. 다만, 초회는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량 또는 감량한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 급성 복부질환(충수염, 장출혈, 궤양성 결장염 등) 환자
 - 장폐색(창자막힘)환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약(식품)을 복용하지 말 것.
제산제 또는 우유 섭취 후 1시간 이내
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 심한 복통(배 아픔) 또는 구역, 구토 환자
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
 - 신장장애 환자
 - 다른 약물을 복용하고 있는 사람
 - 직장의 출혈 혹은 장부전의 병력이 있는 사람
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 이 약을 복용함으로써 발진·충혈되어 붉어짐, 가려움, 심한 복통(배아픔), 설사, 구토 등이 나타날 경우
 - 이 약을 복용함으로써 복부불쾌감 경련이 일어날 경우
 - 1주 정도 투여하여도 변비의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 정기간 계속 사용시 약물에 대한 내성이 증가하고 변비가 악화될 수 있으므로 1주일 이상 계속 사용해서는 안 된다.
만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 변비의 원인을 조사할 것.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
 - 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】

밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 500정/병

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되거나 유통과정 중 변질 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 반드시 설명서를 읽은 후 사용(복용)하시고, 설명서는 약과 함께 보관하십시오.
- ※ 이 첨부 문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.optuspharm.com)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 제품의 유효기간은 외부용기에 표시되어 있습니다.
- ※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국외약품안전관리원(의약품이상사례보고)에 알려주시기 바랍니다.
- ※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시 한국외약품안전관리원에 피해구제를 신청할 수 있습니다.
(부작용 피해구제 신청 : 한국외약품안전관리원(전화 : 1644-6223))
- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품안전나라
의약품통합정보시스템(<http://www.nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

작성일자 : 2025. 08. 13

제조사

NIELSON 한국넬슨제약

충북 음성군 금왕읍 금일로 271-8
소비자 상담실 (02)588-0941

제조의뢰자

OP+US | 옵투스제약

충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명6로 50
소비자 상담실 (02)2118-0030