

일반의약품 정보

이 약을 사용하기 전에 반드시 본 기재사항을 확인하세요

【유효성분】 1캡슐(387밀리그램) 중

아크리놀수화물(KP).....	10 mg
베르베린염화물수화물(KP).....	25 mg
비스무트차질산염(비스무트로서 73 mg)(KP).....	100 mg
스코폴리아염(KP).....	5 mg

【효능·효과】

설사, 복통(배앓음)을 수반하는 설사, 체함, 묽은 변, 토사

【용법·용량】

만 15세 이상 및 성인 : 1회 2캡슐을 1일 3회 식후에 복용한다.
복용간격은 4시간 이상으로 한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 산생아 2) 만 7세 이하의 어린이
3) 이 약은 유당(당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수 장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. - 위장진통·진경(경련완화)제
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.
1) 약으로 알레르기 증상(발진, 홍반 등)이 나타나, 가려움 등을 일으킨 일이 있는 사람 2) 발열을

수반하는 설사 환자, 고령자, 열변 환자 또는 점액변이 계속되는 환자 3) 위 십이지장궤양등이 있는 환자 4) 다른 약물을 복용하고 있는 사람 5) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여할 것.

4. 다음과 같은 사람(경우)이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상감시 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약을 복용함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움 등)이 나타나는 경우 2) 이 약을 복용하는 동안 드물게 입이 마르는 증상이 나타나는 경우 3) 수밀한 투여하도 증상도 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

1) 정해진 용법 용량을 잘 지킬 것. 2) 급성의 심한 설사를 할 경우 또는 구역, 복통(배앓음), 복부팽만 등의 증상을 수반하는 설사를 할 경우에는 이 약으로 무리하게 설사를 멈추게 하면 오히려 병을 악화시킬 수 있으므로 이러한 경우에는 투여에 대하여 의사 또는 약사와 상의한다.
3) 복용시에는 음주하지 말 것. 4) 3일 이상 계속하여 복용하지 말 것.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것. 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기한】 케이스 측면 표시일까지

【포장단위】 10 캡슐/피터피

【첨가제】

·첨가제(타르색소) : 황색5호, 황색203호 ·첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유) ·기타첨가제 : 경질무수규산, 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 겔룰

【성상】 황색의 분말이 충전된 상부, 하부 미황색의 경질캡슐제

【제 조 자】 성이바이오제약 주식회사

강원특별자치도 원주시 지장면 지래로로 184 1층 일부, 3층

【제조(외)사】 신신제약(주)

세종특별자치시 소정면 소정산단동로 9



제조번호:
사용기한:

10 x 46 mm



신신제약

설사 | 묽은 변 | 복통 | 토사
아크리놀수화물, 베르베린염화물수화물 | 장 내 세균에 대한 항균 작용으로 설사 증상을 개선해주는 성분
비스무트차질산염 | 위장 점막을 보호하고 유해 세균을 억제하여 설사 증상을 개선해주는 성분
스코폴리아염

10캡슐 | 만 15세 이상 1회 2캡슐 1일 3회

실물크기

효과 빠른 지사제
설사·묽은 변 등에
신스코베르 캡슐

온누리Health

일반의약품 | 복합지사제

신스코베르 캡슐

효과 빠른 지사제 설사·묽은 변 등에

※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

※ 본 제품의 자세한 허가사항은 의약품전자나라 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조하시기 바랍니다.

※ 구입 시 사용기한이 경과되었거나, 유통과정 중 변질·변패·오염되거나 손상된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

개정연월일 : 2025. 09. 23.