

* 의약품 사용하기 전 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

일반의약품

엑티플루[®] 노즈 캡슐

AF61001-2025-1

[원료약품의 분량] 1캡슐 중

유효성분 : 글리시리진산이칼륨(KP)	21.85mg(글리시리진산으로서 20.0mg)
메퀴타진(KP)	1.33mg
벨라돈나총알칼로이드(JP)	0.13mg(알칼로이드로서 0.13mg)
슈도에페드린염산염(KP)	30.00mg
카페인무수물(KP)	50.00mg

첨가제(타르색소) : 적색 3호, 황색 5호, 황색 203호

첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 콜로이드성이산화규소, 캡슐

[성 상] 흰색 또는 미황색의 과립이 들어있는 상부 주황색, 하부 미황색의 경질캡슐제

[효능·효과] 코감기(급성비염), 알레르기성 비염 또는 부비강염에 의한 다음 증상의 완화 : 코막힘, 콧물, 재채기, 눈물, 목의 통증, 머리 무거움

[용법·용량] 만 15세 이상 및 성인 : 1회 1캡슐, 1일 3회.
매 식후 복용하고 복용간격은 4시간 이상으로 한다.

[사용상의 주의사항]

1. 경고

슈도에페드린 함유 제제 복용 시 급성 전신성 발진성 농포증(AGEP)과 같은 중증 피부 이상반응이 나타날 수 있다.
발열, 홍반, 다수의 작은 농포와 같은 증상이 관찰될 경우 이 약의 복용을 중단하고 의사 또는 약사와 상의해야 한다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- 1) 만 3개월 미만의 영아
- 2) 만 15세 미만의 소아
- 3) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람
- 4) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 항정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람
- 5) 중증 또는 조절되지 않는 고혈압 환자
- 6) 중증 급성 또는 만성 신장질환/신부전 환자

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것

다른 비염(코염)용 경구제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(감기약, 진해(기침을 그치게함)거담제(가래약), 열매약, 알레르기용약 등)

4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

- 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨적이 있는 사람
- 3) 고혈압, 심장질환, 신장질환, 부종(부기), 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨(소변을 누)곤란 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 4) 고령자(노인)
- 5) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
- 6) 다음과 같은 기침이 있는 사람 : 흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

- 7) 슈도에페드린 성분과 관련하여 허혈성 대장염의 증상(급격한 복통, 직장 출혈 등)이 발현될 경우 AF61001-2025-1
 - 8) 감기약, 진해거담제, 비염용 내복약 등으로 불면증, 현기증, 약점, 떨림, 심장의 고동을 일으킨 적이 있는 사람
5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우 : 출혈성비출증, 구역·구토, 목마름(지속적이거나 심한), 변비, 식욕부진, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 배뇨(소변을 누) 곤란, 두통, 안면홍조, 비정상적인 눈부심
 - 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증 증상이 나타난 경우
 - ① 속(아나필락시스) : 복통후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다.
 - ② 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등이 나타날 수 있다.(1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임, 팽임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것)
 - ③ 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히하고 무력감, 사지 경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것
 - ④ 가역적 후비 병증 증후군 및 가역적 뇌혈관 수축 증후군 : 갑작스러운 심한 두통, 번개 두통, 구역, 구토, 돈, 발작, 시각 장애 등이 발현될 수 있다.
 - 3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우
6. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것
 - 2) 정기간 계속 복용하지 말 것
 - 3) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것
 - 4) 복용 시에는 음주하지 말 것
7. 소아에 대한 투여
- 만 2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다.
8. 저장상의 주의사항
- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것
 - 3) 오염(질문 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관 [사용기간] 제조일로부터 36개월 [포장단위] 10캡슐(PTP)

- * 사용기한이 경과한 제품은 복용하지 마시기 바랍니다.
- * 캡슐이 녹거나 변형될 수 있으므로 직사광선 및 고온다습한 곳을 피하여 보관하시기 바랍니다.
- * 제품 취급시 포장재(용기, 케이스)에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의 하시기 바랍니다.
- * 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- * PTP 포장의 약제는, PTP 은박을 삼킬 경우 은박의 예리한 부분이 식도 점막을 손상시킬 수 있으므로, 약제 사용시 반드시 PTP 은박을 잘 분리한 후 복용하시기 바랍니다.
- * 충분한 양의 물과 함께 복용하시기 바랍니다.

- * 이 첨부문서 작성(개정)일 이후 변경된 내용은 다음에서 확인하실 수 있습니다.
- * 소비자상담전화 : 080-520-3131
- * 홈페이지 : www.samil-pharm.com 또는 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)
- * 의약품 부작용 신고 및 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)
- [변질·변태 되었거나 사용기한이 경과한 제품을 구입하셨을 경우에는 구입처를 통하여 직접 교환하여 드립니다.]

첨부문서 작성(개정)일 : 2025년 7월 23일

[제조외뢰 및 판매자] 삼일제약(주)

경기도 안산시 단원구 산단로 216(원시동)

[제조자] 신일제약(주)

충청북도 충주시 양성면 복상골길 28