

먹는 피부 아미노산

더파그램연질캡슐

L-시스틴 500

일반의약품

제품정보 QR코드



*** 이 약을 복용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 첨부문서는 약과 함께 보관하십시오.**

[원료약품 및 그 분량] 이 약 1캡슐(1,460mg) 중

- 유효성분: L-시스틴(JP) 500.00mg (동물유래성분: 오리, 깃털)
- 동물유래성분: 젤라틴(소, 가축)
- 기타첨가제: 농글리세린, 레시틴, 산화티탄, 소르비톨 액(비결정성), 아자경화유, 에틸바닐린, 치자청색소, 콩기름, 홍화황색소, 향남

[성상]

유백색의 유상물질이든 연한 연두색의 장방형 연질캡슐

[효능효과]



습진, 여드름의
보조치료



손톱, 발톱이나 머리카락이 쉽게
갈라지는 등의 각질부위 질환의 보조치료

[용법용량]

L-시스틴으로서 1일 1,000 ~ 2,000 mg을 1개월 중 10 ~ 20일간 복용하세요.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- ① 중증(심한 증상) 신기능 장애 및 간성혼수 환자
- ② 6세 이하의 소아
- ③ 시스틴뇨증 환자
- ④ 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- ⑤ 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- ① 이 약 또는 이 약 구성성분에 과민반응 환자
- ② 신결석증 환자
- ③ 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

상담시 가능한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- ① 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없는 경우
- ② 때때로 구역, 드물게 설사, 구갈(목마름), 가벼운 복통(배아픔) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- ① 정해진 용법·용량을 지키십시오.
- ② 어린이에 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 복용시키십시오.
- ③ 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다.
이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절합니다.
환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

5. 저장상의 주의사항

- ① 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ② 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀봉하여 보관하십시오.
- ③ 오·남용을 피하고 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

[저장방법]

밀폐용기, 실온(1~30℃) 보관

[포장단위]

30캡슐/상자(10캡슐/PTP X 3)



*** 약은 어린이의 손이 닿지 않도록 보관해야 합니다.**

- * KGMP(우수 의약품 제조 및 품질관리기준) 적격업소 제품
- * 구입 시 사용기간이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 사용하지 마시고 구입하신 곳에서 교환하십시오.
- * 제품 사용 후 이상반응(부작용)이 발생한 경우 한국 의약품안전관리원(1644-6223)에 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.
- * 이 첨부문서 작성일자(2025.08.20) 이후 변경된 내용은 종근당 인터넷 홈페이지(www.ckdpharm.com)나 소비자 상담전화(080-6776-080)를 통해 확인할 수 있습니다.

제조의뢰자 :



충청남도 천안시 서북구 성거읍 망향로 797-48
구입처문의 및 소비자상담실 : 080-6776-080(수신자 부담)
제품상세 정보 : www.ckdpharm.com 참조

제조사1:

(주) 알피바이오
/ 경기도 화성시 향남읍
제약공단4길 35-7

제조사2:

(주) 알피바이오
/ 경기도 화성시 마도면 청원산단5길 60
(1층, 2층일부, 3층일부)