

낮·밤을 구분한 비타민 함유 감기약

낮과 밤의 일상이 다르듯, **시콜드 프리미엄**은 다릅니다.
시콜드 프리미엄은 하루 생활패턴에 맞춰 성분을 설계하고
비타민까지 챙긴 프리미엄 감기약입니다.

특 장 점

- ① **낮·밤을 구분한 올데이 케어**
: 낮에는 졸음 유발 성분을 제외해 부담을 낮추고,
밤에는 성분을 보강해 편안한 밤을 보낼 수 있도록 설계되었습니다.
- ② **비타민 3종 함유**
: 비타민C, 활성형 비타민B1, 비타민B2를 함유해 감기를 케어합니다.
- ③ **한번에 한 알 복용하는 편리한 감기약**
: 한 알에 성분을 모두 담아, 복용의 번거로움을 줄였습니다.

주 효능·효과



발열·통증 동반 감기

발열, 오한, 두통, 근육통



코감기

콧물, 코막힘, 재채기



목감기

기침, 인후통, 가래

원료약품 및 그 분량 - 1정 중 -

주간용	
• 유효성분 :	
아세트아미노펜(USP)	325.00 mg
수도에페드린염산염(USP)	30.00 mg
DL-메틸에페드린염산염(KP)	25.00 mg
덱스트로메토르판브로마수소산염수화물(KP)	16.00 mg
구아아콜설폰산칼륨(USP)	60.00 mg
벤포티아민(KP)	5.00 mg
(티아민염산염(으)로서 3.62 mg)	
리보플라빈(KP)	4.00 mg
아스코르빈산 과립(97%/별규)	51.55 mg
(아스코르브산(으)로서 50 mg)	

• 첨가제(타르색소) : 청색2호, 황색4호, 황색5호
• 기타 첨가제 : 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이 AMB II 주황색(88A630022), 오파드라이 QX 흰색(321A180025), 크로스카멜로오스나트륨, 크로스포비돈, 히드록시프로필셀룰로오스

야간용	
• 유효성분 :	
아세트아미노펜(USP)	325.00 mg
수도에페드린염산염(USP)	30.00 mg
DL-메틸에페드린염산염(KP)	25.00 mg
덱스트로메토르판브로마수소산염수화물(KP)	16.00 mg
구아아콜설폰산칼륨(USP)	60.00 mg
벤포티아민(KP)	5.00 mg
(티아민염산염(으)로서 3.62 mg)	
리보플라빈(KP)	4.00 mg
아스코르빈산 과립(97%/별규)	51.55 mg
(아스코르브산(으)로서 50 mg)	
다맨히드라민염산염(USP)	50.00 mg

• 첨가제(타르색소) : 적색40호, 청색5호
• 기타 첨가제 : 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이 AMBII파란색(88A105061), 오파드라이 QX 흰색(321A180025), 크로스카멜로오스나트륨, 크로스포비돈, 히드록시프로필셀룰로오스

성 상

※실제 크기와 상이할 수 있습니다.

주간용 : 주황색의 타원형 필름코팅정제
야간용 : 파랑색의 타원형 필름코팅정제



효능·효과

감기의 증상(생리 증상)(코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 기침, 가래, 오한(출고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

사용상의 주의사항

- 경고 1) 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있습니다. 2) 아세트아미노펜을 복용한 환자에서 매우 드물게 급성 전신성 발진성 농포증(급성 전신성 발진성 고름물집증)(AGEP), 스티븐스-존슨 증후군(SJS), 독성 표피 괴사증(TEN)과 같은 중대한 피부 반응이 보고되었고, 이러한 중대한 피부반응은 치명적일 수 있습니다. 따라서 이러한 중대한 피부반응의 징후에 대하여 환자들에게 충분히 알리고, 이 약 투여 후 피부발진이나 다른 과민반응의 징후가 나타나면 즉시 복용을 중단하도록 하여야 합니다. 3) 이 약은 아세트아미노펜을 함유하고 있습니다. 아세트아미노펜으로 일일 최대 용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 이 약을 일일 최대 용량(4,000mg)을 초과하여 복용하여서는 아니되며, 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용하여서는 안됩니다. 4) 수도에페드린 함유 제제 복용 시 급성 전신성 발진성 농포증(AGEP)과 같은 중증 피부 이상반응이 나타날 수 있습니다. 발열, 흉만, 다수의 작은 농포와 같은 증상이 관찰될 경우 이 약의 복용을 중단하고 의사 또는 약사와 상의해야 합니다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오. 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람 2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기 복용 시 전신을 일으킨 적이 있는 사람 3) 만 3개월 미만의 영아(젖먹이, 갓난아기) 4) 수유부(수유 중인 사람)은 이 약을 복용하지 않거나 수유를 중단할 것) 5) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등을 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람) 이 중증 또는 조절되지 않는 고혈압 환자) 6) 중증 급성 또는 만성 신장질환/신부전 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오. 진해거담제, 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염용 경구제, 열매약, 알레르기용약, 다맨히드라민을 함유하는 제제(피부에 적용하는 제제 포함))
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 1) 수도 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이중증후군의 초기 증상일 수 있으므로 의사와 상의하십시오.) 2) 수도에페드린 성분과 관련하여 허혈성 심장병의 증상(급격한 복통, 작장 출혈 등)이 발생할 경우 3) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람 4) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람 5) 간장질환, 신장질환, 심장질환, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 위십이지장궤양, 녹내장(예: 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨곤란 등이 있는 사람, 고령자, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람 6) 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제나 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부(임신 30주 이후 살리실산나트륨, 살리살아미드, 아스피린, 아스피린알루마늄, 살리실산칼린, 이부프로펜 성분 함유 제제의 투여가 권고되지 않습니다.) 8) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람) 9) 다음과 같은 기침이 있는 사람 : 흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 주: 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침 10) 이 약은 황색화(타르)라진을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자분에게는 신중히 투여합니다. 11) 이 약은 황색화(선셋)로우 FCF, Sunset Yellow FCF를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자분에게는 신중히 투여합니다. 12) 이 약은 적색40(알루라레드 AC, Allura Red AC)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자분에게는 신중히 투여합니다.
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오. 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우 발진·발적, 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 변비, 부종, 배뇨곤란, 목이(지속적)거나 심한, 어지러움, 불안, 떨림, 불면, 고음이나 큰 대서성 산증(HAGMA) 2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증 증상이 나타난 경우 ① 속(아)팔라시: 복용 후 바로 두드러기 부종, 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식욕없, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있습니다. ② 피부발진(만중증후군/스티븐스-존슨 증후군), 중증성표피괴사증(에리절증후군): 고열을 동반하고, 발진·발적, 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈장애에 나타날 수 있습니다. ③ 천식 ④ 간기능장애: 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨) 등이 나타날 수 있습니다. ⑤ 간질성폐렴: 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타납니다. ⑥ 기억력 후회 병증 증후군 및 기억력 뇌혈관 수축 증후군: 갑작스러운 심한 두통, 번개 두통, 구역, 구토, 혼돈, 발작, 시각 장애 등이 발생할 수 있습니다. ⑦ 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우
- 50세 이하의 사람 2세 미만에게 투여하지 않습니다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받습니다.
- 가타 이 약의 복용 시 주의사항 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오. 2) 장기간 계속 복용하지 마십시오. 3) 복용 시에는 음주하지 마십시오. 4) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피하십시오. 5) 바르비탈계 약물, 삼한계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있습니다. 6) 아세트아미노펜과 플루클로사실린의 병용투여에서 피로클로루타민 산중으로 인한 고음이나 큰 대서성 산증(HAGMA)을 유발할 수 있습니다. 가장 위험도가 높은 환자는 패혈증 증상의 산기증, 영양실조 등 기저질환이 있는 환자이며, 이 환자들을 한 가지 또는 두 가지 약물을 모두 중단한 후에 호전되었습니다. 이 약과 플루클로사실린을 동시에 복용할 경우 주의를 기울여야 하고 HAGMA가 의심되면 이 약 및/또는 플루클로사실린 투여를 중단합니다.

저장상의 주의사항

- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.
- 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

저장방법 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위 10 정/상자(10정/PTP)X11)

사용기간 제조일로부터 36개월



※ 약품 사용전에 설명서를 주의깊게 읽으십시오. 설명서는 제품과 함께 보관하십시오.
※ 이 첨부문서 최종 개정 연월일 이후 변경된 내용은 대웅제약 홈페이지(www.daewoong.co.kr) 및 소비자상담 전화번호(080-550-8308~9)에서 확인할 수 있습니다. 2303282

용법·용량

주 간 만 15세 이상 및 성인: 1일 2회, 1회 1정 식후 30분에 복용하십시오.

야 간 만 15세 이상 및 성인: 1일 1회, 1회 1정 식후 30분에 복용하십시오.

※ 본 약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변색, 오염되었거나 손상된 의약품은 공정거래위원회 고시(소비자 분쟁해결기준)에 의해, 구입한 약국 및 의약품판매업자를 통해 교환 또는 환불받을 수 있습니다.
※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국약물관리전권리원(4-3330, 1644-6223) 제조자 : (주)대웅제약 / 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-1

작성 연월일 : 2025.07.10
최종 개정 연월일 : 2025.11.10

H01