

일반의약품

IMQF001001

메이퀸[®]에프
장용정

MayQueen F EC Tab.

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

- 유효성분 : 비사코딜(KP)..... 5mg
센노시드(USP)..... 5.5mg
[센노시드A·B로서 3.3mg]
도큐세이트나트륨(USP)..... 14mg
우르소데옥시콜산(KP)..... 6mg
- 첨가제(타르색소) : 청색1호, 황색203호, 황색4호, 황색5호
- 기타첨가제 : 메타아크릴산공중합체, 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 시트르산트리에틸, 에틸셀룰로오스 수분산액, 오파드라이II 녹색(85F610023), 저치환도히드록시프로필셀룰로오스, 콜로이드성 이산화규소, 크로스카르멜로오스나트륨, 크로스포비돈, 셀크, 폴리 에틸렌글리콜4000, 폴리에틸렌글리콜6000, 히프로멜로오스

【성상】 녹색의 원형 장용성 필름코팅정

【효능·효과】

변비, 변비에 따른 다음 증상의 완화 : 식욕부진(식욕감퇴), 복부팽만, 장내 이상발효, 지질

【용법·용량】 1일 1회 취침 시 **잠자기 전** 에 다음과 같은 양을 복용합니다.

－ 만 15세 이상 : 1회 1~3정

다만, 초회(처음)는 최소량을 복용하고 변의 모양과 상태를 보면서 조금씩 증량(양을 늘림) 또는 감량(줄임)합니다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 급성 복부질환(충수염, 장출혈, 궤양성 결장염 등) 환자
 - 장폐색(창자막힘) 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약(식품)을 복용하지 말 것.
제산제 또는 우유 섭취 후 1시간 이내
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 심한 복통(배 아픔) 또는 구역, 구토 환자
 - 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
 - 다른 약물을 복용하고 있는 사람
 - 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
 - 직장의 출혈 혹은 장부전의 병력이 있는 사람

- 이 약은 황색4호(타르트라진), 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에게는 신중히 투여할 것
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것(상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것).
 - 이 약을 복용함으로써 발진·충혈되어 붉어짐, 가려움, 심한 복통(배 아픔), 설사, 구토 등이 나타날 경우
 - 이 약을 복용함으로써 복부불쾌감, 경련이 일어날 경우
 - 1주 정도 투여하여도 변비의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 반드시 필요한 경우 이외에는 만 10세 이하의 어린이는 복용을 피하는 것이 바람직하다.
 - 복용 시 정제를 씹지 말 것.
 - 장기간 계속 사용 시 약물에 대한 내성이 증가하고 변비가 악화될 수 있으므로 1주일 이상 계속 사용해서는 안된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 변비의 원인을 조사할 것.
- 저장상의 주의사항
 - 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
 - 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)

【포장단위】 20정/상자(10정/PTP×2), 40정/상자(20정/PTP×2), 200정/병, 500정/병

【최신정보 확인방법】 설명서 작성일자 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지에서 확인할 수 있습니다.

【제품문의처】 소비자 상담실 : 080-587-7575(수신자 요금부담)

의약품 사용 후 부작용 발생 시, 부작용 신고 및 피해구제 신청은
한국의약품안전관리원에 할 수 있습니다.

신청방법 ☎ 1644-6223, 14-3330 | ☐ karp.drugsafe.or.kr

- ※ 유통과정 중 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품은 약국 개설자 및 의약품판매업자에 한하여 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.

http://www.myunginph.co.kr 설명서 작성년월일 : 2026. 07. 16



※ 본 의품을 복용하기 전에 설명서를 주의깊게 읽고,
본 의약품과 함께 보관하십시오.

O T C

IMQF001001

MAYQUEEN F

Enteric Coated Tab.

【COMPOSITION】 Each tablets contains

Active Ingredients:
Bisacodyl 5mg
Sennosides 5.5mg
Docusate Sodium 14mg
Ursodeoxycholic acid 6mg

【APPEARANCE】 Green round enteric film-coated tablet

【INDICATIONS FOR USE】

－Relief of constipation

－Relief of the following symptoms of constipation: anorexia (loss of appetite), abdominal distention, abnormal fermentation in the intestines, hemorrhoids

【DOSAGE AND ADMINISTRATION】

Take the following amount once a day at bedtime.

Adults and children 15 years of age and over

1~3 tablets in a single daily dose

It is recommended to start with the lowest dose and gradually increase or decrease the doses according to the shape and condition of the stool.

【CAUTIONS FOR USE】

1. Contraindication

- Patients with acute abdominal conditions (acute appendicitis, intestinal bleeding, ulcerative colitis etc.)
- Patients with ileus (intestinal obstruction)
- Do not take the following medicines (or foods) while taking this product: Within 1 hour after taking antacids or consuming milk
- Consult a doctor, dentist, or pharmacist before use if you have any of the following conditions:
 - Severe abdominal pain, or nausea and vomiting
 - Pregnant women or women of childbearing potential
 - Taking any other medications
 - A personal or family history of allergic conditions

- A history of rectal bleeding or intestinal failure
- This medication contains Yellow No. 4 (tartrazine) and Yellow No. 5 (Sunset Yellow FCF). Must use with caution in patients who are sensitive to these ingredients or have a history of allergies.

4. Immediately stop taking this medication and consult a doctor, dentist, or pharmacist in the following cases. (Please bring this attachment with you if possible when consulting)

- If you experience rash, redness, itching, severe abdominal pain (stomach pain), diarrhea, vomiting, etc.
- If you experience abdominal discomfort or convulsions
- If you have taken this medication already for a week without any effect

5. General Precautions

- Follow the recommended dosage and administration.
- It is advised to avoid administration to children under 10 years of age unless necessary.
- Do not chew tablets.
- Do not take for more than a week. Extended use of any laxative can increase tolerance to the medication and may worsen constipation. If you need laxatives everyday, you should investigate the cause of constipation.

6. Precautions for storage

- Keep out of reach of children.
- Keep out of direct sunlight and keep sealed in a cool, dry place.
- To prevent misuse and preserve the quality, do not change into another container.

【STORAGE】

Well-closed container, Store at a room temperature (1~30℃)

【PACKAGING】

20 tablets/box (10 tabs/PTP×2), 40 tablets/box (20 tabs/PTP×2), 200 tablets/bottle, 500 tablets/bottle

※ This product has been approved under a strict quality control system.

http://www.myunginph.co.kr

