

■ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질·변패·오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국 및 도매상을 통해 교환하여 드립니다.
 ■ 의약품의 정상적인 사용에도 불구하고, 부작용이 발생하는 경우 **부작용 신고 및 피해구제 신청**은 한국약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)에 할 수 있습니다.
 제품 개봉 시 또는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.



제조번호:
사용기한:
(연.월.일)

일반의약품



종합 소화제 속편한정

시메티콘 성분 함유(가스제거)

⊕ 시메티콘 25 mg, UDCA 10 mg 함유

종합 소화제
속편한정

소화불량 | 소화촉진 | 체합 | 과식

10정

【성 상】 연녹색의 타원형 장용성 필름코팅정

【제조사】 (주)노바엠헬스케어 경상북도 경산시 하양읍 자식산업4로 16-53

【제조회자】 에스케이케미칼(주) 충청북도 청주시 흥덕구 산단로 149

※ 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.skchemicals.com/ls)나

제품상단 전용전화(무로: 080-021-3131)를 통하여 확인할 수 있습니다.

※ 자세한 사항은 '의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr)'을 참조하십시오.

NOVA M³
Healthcare
(주)노바엠헬스케어
2025.7.24 작성 (Ver.001)

일반의약품 정보

이 약을 사용하기 전 반드시 아래의 기재사항을 확인하세요.

【유효성분】 1정 중

판크레아틴(KP) 175mg
(전분당화력 1,654 단위 이상, 지방소화력 677 단위 이상, 단백소화력 22,365 단위 이상)(기원동물: 돼지, 사용부위: 췌장)

셀룰라제(KP) 50mg
(성우소당화력 60단위 이상)

우르소데옥시콜산(KP) 10mg
시메티콘(KP) 25mg

【효능·효과】

소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 체합, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감

【용법·용량】 만 15세이상: 1회 2정, 1일 3회 식후에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
1) 만 7세 이하의 어린이
- 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactosemalabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다. ➔

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
상당 시 가능한 한 이 첨부문서(카툰)를 소지할 것.

2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 유효수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
- 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【포장단위】 10정/상자(10정/PTP1)

【저장방법】 밀폐용기, 실온보관(1~30℃)

【사용기한】 용기 측면 표시일까지

【첨가제】

- 타르색소: 황색203호, 청색1호
- 동물유래: 유당수화물(기원동물: 소, 사용부위: 우유)
- 기타첨가제: 히드록시프로필셀룰로오스, 미정질셀룰로오스, 이산화규소, 전분글리콜산나트륨, 크로스카르멜로스나트륨, 스테아르산마그네슘, 히드로멜로오스, 폴리메틸렌글리콜6000, 탈실드녹색(39G1527)