




일반의약품
조제용

효과빠른 종합소화제 베로타에이정 500정

bas khanbio

【원료약품 및 분량】1정 중

■ 유효성분 : 판크레아틴(KP)(전분당화력 250단위 이상, 지방소화력 100 단위 이상, 단백소화력 1500 단위 이상).....175mg
셀룰라제(KP)(섬유소당화력 13 단위 이상).....50mg
우르소데옥시콜산(KP).....10mg
시메티콘(KP).....25mg

■ 동물유래성분 : 판크레아틴(돼지, 이자(췌장)), 유당(젖당)수화물(소, 우유)

■ 첨가제(타르색소) : 황색 203호, 청색 1호

■ 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 이산화규소, 전분글리콜 산나트륨, 크로스카멜로오스나트륨, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스, 폴리에틸렌글리콜6000, 탭실드녹색(39G1527)

【성상】 연녹색의 타원형 장용성 필름코팅정

【효능·효과】 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 체함, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감

【용법·용량】 만 15세 이상 : 1회 2정, 1일 3회 식후에 복용한다.

【사용상의 주의사항】 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

1) 만 7세 이하의 어린이 2) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

2주 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

5. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것. 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【제조회사】 (주)바스칸바이오제약 / 경기도 안성시 원곡면 원당로 354

【제조사】 (주)노바엠헬스케어 / 경상북도 경산시 하양읍 지식산업4로 16-53

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입 시 사용기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다. ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품을 사용하지 않도록합니다. ※ 의약품 부작용 신고 및 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원 (1644-6223, 14-3330) ※ 소비자상담전화 : 031-692-2900 ※ 작성일자[2025.08.28(Rev.0)] 이후 변경된 내용은 의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr) 참조

【제조번호】

35x18mm

【사용기한】

L250828-0



(01)88806562055210 재활용 어려움