

일반의약품

조제용

원타제 정

1000정

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

유효성분 : 결정트립신(USP)(2,500 (USP 트립신 단위)) (소, 돼지(이지)) ----- 1mg, 브로멜라인(KP) (20,000(브로멜라인 단위)) ----- 40mg

첨가제(동물유래성분) : 유당수화물 (소, 우유) / 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 클로이드성이산화규소, 크로스포비돈, 탭실드 녹색 319G726, 탭실드 흰색 11W401

【성상】 연녹색의 원형 정용성 필름코팅정

【효능·효과】 다음 질환 및 증상의 염증성 부종(부기의 완화 : 수술 및 외상(상처)후, 유즙울체(젖고임)

【용법·용량】 성인 : 첫날 1회 2정, 1일 4회, 이후 유지량으로 1회 1정, 1일 4회 복용한다.

체내에서의 작용기간은 아직 해명되지 않은 점이 많고 용량, 효과관계도 밝혀진 것이 아니므로 목적 없이 투여하지 않는다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것.

1) 혈액응고이상 환자

2) 심한 간장애 또는 신장애(신장(콩팥)장애) 환자

3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(임신중 투여에 관한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 치료상의 유의성이 위험성을 상회(웃돌)한다고 판단되는 경우에만 투여한다.)

4) 항응고제를 투여하고 있는 환자(병용(함께 복용(사용))투여에 의해, 항응고제의 작용이 증강될 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 신중히 투여한다.)

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 과민반응 : 발진, 발적(충혈되어 붉어짐) 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.

2) 소화기계 : 설사, 변비, 때때로 식욕부진, 배가 거북함, 구역, 구토 등의 증상이 나타날 수 있다.

3) 혈액계 : 드물게 코피, 혈액가래 등의 출혈 경향이 나타날 수 있다.

4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

5. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.

2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 【사용기간】 제조일로부터 36개월 【포장단위】 1000정/병

【제조외지】 (주)시어스제약 / 경기도 화성시 향남읍 발안공단로 32

【제조지】 (주)노바엠피헬스케어 / 경상북도 경산시 하양읍 지식산업4로 16-53

【판매지】 (주)베스트약품 / 경기도 하남시 검단산로 108 (하산곡동)

※ 올바른 복용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우는 의사·약사와 상담하십시오. ※ 본 의약품은 "우수약품제조관리기준(KGMP)"에 따라 엄격하게 품질관리를 실시한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패, 오염 또는 손상된 제품은 구입한 장소에서 교환하여 드립니다. ※ 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽어와야 하며, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다. ※ 의약품을 어린이 손에 닿지 않는 장소에 보관합니다. ※ 사용(유효) 기한이 지난 의약품은 사용하지 않도록 합니다. ※ 이 설명서 작성(개정)일 이후 변경된 내용 및 기타 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템 (<https://redrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다. ※ 기타 자세한 사항이나 문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 소비자상담실 (070-4227-2316)로 문의하시기 바랍니다. ※ 부작용 피해구제 신청: 한국약품안전관리원(1644-6223/14-3333)

제조번호:

사용기한:

(부분 무코팅)
35 x 18



2025.08.26(00)

