



일반의약품 정보

이 약을 사용하기 전에 반드시 본 기재사항을 확인하세요

【유효성분】 1캡슐 중

아크리놀수화물(KP).....	10 mg
베르베린염화물수화물(KP).....	25 mg
비스무트차질산염(비스무트로서 73 mg)(KP).....	100 mg
스쿠폴리아엑스(KP).....	5 mg

【효능·효과】

설사, 복통(배아픔)을 수반하는 설사, 체함, 묽은 변, 토사

【용법·용량】

만15세 이상 및 성인 : 1회 2캡슐을 1일 3회 식후에 복용한다.
복용간격은 4시간 이상으로 한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 신생아 2) 만 7세 이하의 어린이 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수 장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에는 투여하지 마십시오.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오 - 위장진통 - 진경경련완화제
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 하십시오.
1) 악으로 알레르기 증상(발진, 종혈되어 붉어짐, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 사람 2) 발열을 수반하는 설사, 전진, 고령자, 혈변 환자 또는 장애인이 계속되는 환자 3) 위 - 십이지장궤양등이

있는 환자 4) 다른 약물을 복용하고 있는 사람 5) 이 약은 황색5호(선향염로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.

4. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 이 첨부문서를 소지하십시오.

1) 이 약을 복용함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움 등)이 나타나는 경우 2) 이 약을 복용하는 동안 드물게 일어 마르는 증상이 나타나는 경우 3) 수일간 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

1) 정해진 용법 : 용량을 잘 지켜십시오. 2) 급성의 심한 설사를 할 경우 또는 구역, 복통(배아픔), 복부팽만 등의 증상을 수반하는 설사를 할 경우에는 이 약으로 무리하게 설사를 멈추게 하면 오히려 병을 악화시킬 수 있으므로 이러한 경우에는 투여에 대하여 의사 또는 의사와 상의하십시오. 3) 복용시에는 음주하지 마십시오. 4) 3일 이상 계속하여 복용하지 마십시오.

6. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관하십시오. 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기한】 케이스 측면 표시일까지

【포장단위】 10캡슐/피티피, 1000캡슐/상자(10캡슐/피티피×100)

【첨가제】

- 첨가제(타르색소) : 황색5호, 황색203호
- 동물유래성분 : 유당수화물 (소의 우유)
- 기타첨가제 : 옥수수전분, 캡슐, 스테아르산마그네슘, 경질무수규산, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘

【성상】 황색의 분말이 충전된 상부, 하부 미황색의 경질캡슐체

【제조회자】



경보제약

(주) 경보제약 / 충청남도 아산시 실목로 174

【제 조 자】

성이바이오제약 주식회사

강원특별자치도 원주시 지정면 지래울로 184 1층 일부, 3층



KyongBo Pharm 宗근당홀딩스 가족회사

| 일반의약품 |

정장지사제 장엔큐

캡슐

▶ 설사 ▶ 묽은변
▶ 체함 ▶ 복통(배아픔)

10캡슐

정장지사제 장엔큐 캡슐

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 통한 제품입니다. 만약, 구입 시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변색, 오염, 손상된 의약품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 약을 사용하기 전에 반드시 본 포장케이스의 기재사항을 주의깊게 읽어보시고 포장케이스를 항상 약과 함께 보관하십시오.

※ 자세한 사항은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr)을 참조하세요.

※ 부작용 발생 시 피해 구제 상담 : 14-3330 ※ 부작용 신고 및 피해 구제 상담 : 1644-6223

I01 · 250731
작성 연월일 : 2025.09.15

110mm