

❖ 코오롱제약		Design by RX DESIGN STUDIO	
품명	마그포스 트리플 정		진행일: 2025.10.15
규격	140 x 200 mm	종이	
색상	1도(BLACK) ●	코팅	
		후가공	

마그포스 트리플 정

일반의약품

이 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽으시고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

【원료약품 및 그 분량】이 약 1정 중

- 유효성분 : 산화마그네슘(KP) 445 mg
시트르산마그네슘수화물(EP) 50 mg
글리세로인산마그네슘(EP) 50 mg
(총 마그네슘으로서 280.59mg)
토코페롤아세테이트 2배산(KP) 110 mg
(비타민E로서 55I.U)
벤포티아민(KP) 50 mg
(티아민염산염으로서 36.15mg)
피리독신염산염(KP) 50 mg
셀레늄함유건조효모(KP) 30 mg
(셀레늄으로서 16.2µg)
메코발라민(KP) 0.5 mg

• 기타 첨가제 : 경질무수구산, 미결정 셀룰로오스(102), 스테아르산마그네슘, 크로스포버딘, 탭실디칼색(29B1093), 히드록시프로필셀룰로오스

【성상】갈색의 타원형 필름코팅정

【효능·효과】

- 다음 경우의 비타민 B₁, B₆, E 의 보급
 - 육체피로
 - 임신·수유기
 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하 시
 - 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
 - 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등), 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
 - 각기
 - 눈의피로
- 마그네슘결핍으로 인한 근육경련

【용법·용량】

만 15세 이상 및 성인: 1일 1회 1정 복용한다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 2) 만 12개월 미만의 젖먹이
 - 3) 심한 증상의 신부전 환자
 - 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
 - 2) 레보도파
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - 3) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성 대장염 등의 위장질환 환자
 - 4) 심장·순환 기계기능 장애 환자
 - 5) 신장(콩팥)장애 환자
 - 6) 저단백혈증 환자
 - 7) 임부
 - 8) 고지단백혈증, 당뇨병성고지혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은 변, 붉은 반점,

- 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 피부염, 땀·호흡시 악취, 탈모, 조급증
 - 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
 - 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
 - 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
 - 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10 µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
 - 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 율혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
 - 항알도스테론제, 트리아멘텐과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
 - 우발적으로 과량복용 한 경우
 - 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- ## 5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 2) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.
- ## 6. 일반적 주의
- 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장 지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다.
- 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.
- ## 7. 저장상의 주의사항
- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 (밀폐하여) 보관할 것.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30°C)보관

【사용기한】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 60 정/병, 120 정/상자 (60정/병x2)

【소비자상담】 080-203-6000(수신자 요금부담)

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용(유효)기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오염되거나 손상된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 첨부문서 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 코오롱제약 홈페이지(<http://www.kolonpharm.co.kr>)나 소비자보호실 (TEL: 080-203-6000)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 자세한 의약품 정보는 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)의 '의약품검색'란을 참조하세요.

- **제조사** : 메덱스제약(주)
전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단6로 170
- **제조의뢰자·판매원** : 코오롱제약(주)
대전광역시 대덕구 문평서로18번길 45

❖ 코오롱제약

최초 작성연월일 2025.07.31
MFTT250908