

일반의약품 정보

이 약을 사용하기 전 반드시 아래의 기재사항을 확인하세요.

[유효성분] 1정(470 mg) 중

락토바실루스스프로게네스균(1.0×10^7 개 이상)(별규)..... 5mg
비스무트차질산염(KP) 100mg
베르베린염화물수화물(KP) 20mg
스코폴리아엑스(KP) 5mg
아크리놀수화물(KP) 10mg

[효능·효과] 설사, 복통(배아픔)을 수반하는 설사, 체함, 묽은 변, 토사

[용법·용량] 만 15세 이상 및 성인 : 1일 3회, 1회 2정을 식후에 복용한다.
복용간격은 4시간 이상으로 한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 신생아 2) 만 7세 이하의 어린이 3) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수 장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
위장진통·진경(경련완화)제

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 1) 약으로 알레르기 증상(발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움 등)을 ➔

일으킨 일이 있는 사람 2) 발열을 수반하는 설사 환자, 고령자(노인), 혈변 환자 또는 점액변이 계속되는 환자 3) 위·십이지장궤양등이 있는 환자 4) 다른 약물을 복용하고 있는 사람 5) 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

4. 다음과 같은 사람(경우) 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 이 첨부문서를 소지할 것. 1) 이 약을 복용함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움 등)이 나타나는 경우 2) 이 약을 복용하는 동안 드물게 입이 마르는 증상이 나타나는 경우 3) 여러 차례 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 복용 시에는 음주하지 말 것. 3) 3일 이상 계속하여 복용하지 말 것.

6. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것. 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 밀폐용기, 실온(1~30°C)보관

※ 어린이의 손에 닿지 않게 보관하십시오.

[포장단위] 10정/PTP

[사용기한] 측면 표시일까지

[첨가제]

·첨가제(타르색소) : 황색 4호 ·첨가제(동물유래성분) : 유당(젖당)수화물(기원: 소, 사용부위: 우유) ·기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 이산화규소, 전분글리콜산나트륨, 크로스카멜로오스나트륨, 톨크, 폴리에틸렌글리콜 6000, 히드록시프로필셀룰로오스, 히프로멜로오스

[성상] 노란색의 원형 필름코팅정