

|              |                         |      |                                                                                   |                  |                  |
|--------------|-------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 제품명          | 콘택콜드 캡슐                 |      |                                                                                   | 규격               | 125 * 260 mm     |
| 자재구분         | 첨부문서                    |      |                                                                                   | 용지               | 모조 70g           |
| 개정번호   파마코드  | MG439014/01             | 4621 |  | 코팅               | -                |
| 자재업체         | 무궁화LNB                  |      |                                                                                   | 후가공              | -                |
| RA           | 의약품개발팀 김의운 사원(0710)     |      |                                                                                   | Color            | 먹 1도             |
| QA           | QA팀 조용규 기사(1114)        |      |                                                                                   |                  | <div>Black</div> |
| DESIGN       | 홍보팀 김석현 과장(02-828-0078) |      |                                                                                   | 문안<br>Check List | ■ min 7pt        |
| 작성일자         | 2025-08-27              |      |                                                                                   |                  |                  |
| 수정 및<br>확인사항 | 신제품                     |      |                                                                                   | 비고               |                  |

MG439014/01

일반의약품


# 콘택콜드 캡슐

원료약품 및 분량 1캡슐 중

- 유효성분**  
클로르페니라민말레산염(KP) ----- 3mg  
벨라돈나총알칼로이드(JP) ----- 0.133mg  
(알칼로이드로서 0.133mg)  
슈도에페드린염산염(USP) ----- 60mg
- 첨가제(타르색소)** : 황색203호, 황색4호, 황색5호, 청색1호, 적색40호
- 기타 첨가제** : 구형백당, 포비돈, 오파드라이흰색(85G68914), 오파드라이주황색(85F43053), 오파드라이적색(85G45036), 탭크, 캡슐

성 상

흰색, 적색 및 노란색의 구형과립이 충전된 상부 적색투명, 하부 무색투명한 경질캡슐




효능 · 효과

코감기 (급성비염), 알레르기성 비염 또는 부비동염에 의한 다음 증상의 완화: 코막힘, 콧물, 재채기, 눈물, 인후통(목구멍통증), 머리 무거움



용법 · 용량

- 만 15세 이상: 1회 1캡슐씩 1일 3회, 매 식후에 복용합니다.



- ※ 그림과 같이 캡슐포장의 불룩한 부분을 화살표 방향으로 누르고 캡슐만 꺼내 복용합니다.  
이 때 실수로 알루미늄 포장을 함께 복용하는 일이 없도록 합니다.  
※ 충분한 양의 물과 함께 복용하시기 바랍니다.

사용상의 주의사항

- 경고**  
슈도에페드린 함유 제제 복용 시 급성 전신성 발진성 농포증(AGEP)과 같은 중증 피부 이상반응이 나타날 수 있습니다. 발열, 홍반(붉은 반점), 다수의 작은 농포(고름물집)와 같은 증상이 관찰될 경우 이 약의 복용을 중단하고 의사 또는 약사와 상의해야 합니다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.**  
1) 만 3개월 미만의 영아(갓난아기)  
2) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람  
3) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람  
4) 중증 또는 조절되지 않는 고혈압 환자  
5) 중증 급성 또는 만성 신장질환/신부전 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음 약물 복용(사용)하지 마십시오.**  
다른 비염(코염)용 경구제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(감기약, 진해(기침을 그치게 함)거담제(가래약), 멀미약, 알레르기용약 등)
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.**  
1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 편두통, 음식을 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람  
2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람  
3) 심장질환, 녹내장(예: 눈의 통증, 눈이 침침함 등), 배뇨(소변을 냄)곤란 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람

- 고령자(노인)
- 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
- 다음과 같은 기침이 있는 사람  
출연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침
- 슈도에페드린 성분과 관련하여 허혈성 대장염의 증상(급격한 복통(배아픔), 직장 출혈 등)이 발현될 경우
- 이 약은 황색4호(타르트라진), 황색5호(선셋옐로우 FCF), 적색40호(알루라레드 AC), 황색203호(퀴놀린옐로우 WFS)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다.

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증 증상이 나타난 경우  
출혈성뇌졸중, 구역·구토, 목마름(지속적이거나 심한), 변비, 식욕부진, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 배뇨(소변을 냄)곤란, 두통, 안면홍조, 비정상적인 눈부심
- 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증 증상이 나타난 경우
  - 속(아나필락시스): 복용후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있습니다.
  - 가역적 후뇌 병증 증후군 및 가역적 뇌혈관 수축 증후군: 갑작스러운 심한 두통, 번개 두통, 구역, 구토, 혼돈, 발작, 시각 장애 등이 발현될 수 있습니다.
- 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

6. 소아에 대한 투여

만 2세 미만에게 투여하지 않습니다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받습니다.

7. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 장기간 계속 복용하지 마십시오.
- 소아에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킵니다.
- 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피합니다.
- 복용시에는 음주하지 마십시오.

8. 저장상의 주의사항



- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.



- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.



- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

저장방법 밀폐용기, 실온(1~30℃) 보관

사용기한 외부포장에 표기

- ※ 블리스터 포장의 제호번호 / 사용기한 표시 방법은 다음과 같습니다.  
예) 제호번호 #25001, 사용기한 2028.10.05인 경우 "25001/281005"로 표시

포장단위 10캡슐(10캡슐/PTPx1)

- ※ 이 제품은 정부의 "소비자분쟁해결 기준"에 의거 구입처를 통하여 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.
- ※ 이 첨부문서의 작성연월일 이후 변경내용은 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 이 제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국 의약품안전관리원(1644-6223)에 문의하여 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

첨부문서 작성연월일 2025.09.08



제조판매자

유한양행

본사 : 서울특별시 동작구 노량진로 74  
공장 : 충북 청주시 청원구 오창읍 연구단지로 219

홈페이지 : [www.yuhan.co.kr](http://www.yuhan.co.kr)

소비자상담실 : 080-024-1188(수신자 요금부담)

MG439014/01