

오라비텐 액티브정

비타민B 10종 함유

활성형 비타민 B₁, B₂, B₆ 함유 | 구내염·설염 | 눈의 피로 | 육체피로 | 체력저하 | 근육통

OBTI-001

[원료약품 및 그분량] 1정 중,

• 유효성분:

• 벤포티아민(KP) ····· 50.00mg	티아민염산염으로서 36.15mg	• 폴산(KP) ····· 0.25mg
• 리보플라빈(KP) ····· 40.00mg		• 시아노코발라민(KP) ····· 0.50mg
• 리보플라빈부티레이트(KP) ····· 10.00mg		• 아스코르브산(KP) ····· 30.00mg
• 니코틴아미드(KP) ····· 50.00mg		• 토코페롤아세테이트 2배산(KP) ··· 20.00mg
• 판토텐산칼슘(KP) ····· 50.00mg		• 산화아연(KP) ····· 18.70mg
• 피리독신염산염(KP) ····· 50.00mg		• 우르소데옥시콜산(KP) ····· 15.00mg
• 피리독살포스페이트수화물(KP) ····· 10.00mg		• 콜린타르타르산염(별규) ····· 50.00mg
• D-비오틴(USP) ····· 0.25mg		• 셀레늄함유 건조효모(KP) ····· 46.30mg
• 이노시톨(KP) ····· 50.00mg		

• 첨가제: 경질무수규산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 크로스포비돈, 탭셀드칼색(29B1093), 히드록시프로필셀룰로오스

[성상] 갈색의 장방형 필름코팅정

[효능·효과]

1. 다음 경우의 비타민 E, B₁, B₂, B₆, C의 보급

- 육체피로
- 임신·수유기
- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하
- 노년기

2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.

- 비타민B₁(벤포티아민)
 - 다음 증상의 완화: 신경통, 근육통, 관절통(요(허리)통, 어깨결림 등) • 각기 • 눈의 피로
- 비타민B₂(리보플라빈, 리보플라빈부티레이트), B₆(피리독신염산염, 피리독살포스페이트수화물)
 - 다음 증상의 완화: 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

3. 아연의 보급

[용법·용량] 만 12세 이상 및 성인: 1일 1회 2정 복용

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 만 12개월 미만의 젖먹이
- 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

- 인산염, 칼슘염, 경구(먹는)용 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 고옥살산노증 환자(hyperoxaluria: 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태)
- 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성(특정 부분에 나타나는)대장염 등의 위장질환 환자
- 심장·순환기계기능 장애 환자
- 신장(콩팥)장애 환자
- 저단백혈증 환자
- 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석이 있는 환자
- 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 헤장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은 변, 식욕부진, 복부(배부분)팽만감, 위장관장애, 소화장애, 상복부(배부분)통증, 저혈압, 폐부종(부기), 피부염, 땀·호흡시 악취, 탈모, 조급증
- 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
- 에스트로겐을 포함한 경구(먹는)용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있다.
- 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- 피리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
- 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
- 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
- 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용)투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
- 우발적으로 과량복용 한 경우
- 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사지에 영향을 줄 수 있다.
- 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.
- 지방과 부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

6. 저장상의 주의사항

- 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
- 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보전을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[포장단위] 20정/상자(10정/PTP×2)

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30°C)보관

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품이며 공정거래위원회고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다. 만약, 구입 시 사용(유효)기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다. ※ 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 의약품과 함께 보관하십시오. ※ 가장 최근 개정된 제품설명서의 내용 등 본 제품에 대한 정보는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>) 또는 당사 홈페이지(<http://www.dkpharm.co.kr>)에서 확인하실 수 있습니다. ※ 제품에 관한 의문사항은 동국제약(주) 소비자상담실 ☎080-550-7575: 수신자 요금 부담)로 문의 주십시오. ※ 부작용 피해구제 신청: 한국의약품안전관리원(1644-6223, 14-3330)

- 제조의뢰자: 동국제약(주) 충청북도 진천군 광혜원면 용소2길 33-19
- 제조자: 메디스제약(주) 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단6로 170

설명서 최종 개정 연월일: 2025. 09. 15

Dongkook 동국제약(주)