

- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 변질·변해·오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국 및 도매상을 통해 교환하여 드립니다.
 - 의약품의 정상적인 사용에도 불구하고, 부작용이 발생하는 경우 **부작용 신고** 및 **피해구제 신청**은 한국약물관리원(1644-6223, 14-3330)에 할 수 있습니다.
- 제품 개봉 시 도는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.



일반의약품

SK 케미칼

유산균 함유 지사제 락토큐 정



설사 | 복통 | 묽은변 | 토사 | 체함

10정

10정

정

락토큐
유산균 함유 지사제

【제조사】(주)노바엠헬스케어 경상북도 경산시 하양읍 지식산업4로 16-53
 【제조외회사】에스케이케미칼(주) 충청북도 청주시 흥덕구 산단로 149
 ※ 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.skchemicals.com/ls)나
 제품상단 전용전화(무료: 080-021-3131)를 통하여 확인할 수 있습니다.
 ※ 자세한 사항은 '의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr)'을 참조하십시오.

NOVA M3
Healthcare
(주)노바엠헬스케어
2025.9.1 작성(Ver.001)

일반의약품 정보

이 약을 사용하기 전 반드시 아래의 기재사항을 확인하세요.

【유효성분】

1정 중

비스무트차질산염(KP) ... 100mg, 스킵로리아엑스(KP) ... 5mg,
 아크리놀수화물(KP) ... 10mg, 베르베린연화물수화물(KP) ... 20mg,
 락토바실루스스포르게네스균(별규)(1.0×10^7 개 이상) ... 5mg

【성상】

노란색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】

설사, 복통(배아픔)을 수반하는 설사, 체함, 묽은 변, 토사

【용법·용량】

만 15세 이상 및 성인: 1일 3회, 1회 2정을 식후에 복용한다.
 복용간격은 4시간 이상으로 한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 일부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 신생아 2) 만 7세 이하의 어린이 3) 이 약을 복용할 필요없고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당 분해효소 결핍증(Lapp lactose deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. - 위장진동, 진경제 →

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 1) 약으로 알레르기 증상(발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 사람
 2) 발열을 수반하는 설사, 고열, 구토, 혈변 환자 또는 설악면이 계속되는 환자 3) 위·십이지장궤양이 있는 환자 4) 다른 약물을 복용하고 있는 사람 5) 이 약은 황색4호트립타진을 함유하고 있으므로 이 성분과 관련하여나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

4. 다음과 같은 사람(경우)이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 상단 시이 침부류(세카툼)를 사용하지 것
 1) 이 약을 복용함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움 등)이 나타나는 경우 2) 이 약을 복용하는 동안 드물게 일어는 증상이 나타나는 경우 3) 여러 차례 투여하더라도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것. 2) 복용 시에는 음주하지 말 것. 3) 3일 이상 계속하여 복용하지 말 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것. 3) 오염(열등 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【포장단위】

10정/상자(10정/PTP)

【저장방법】

밀폐용기, 실온(1-30℃)보관

【사용기한】

유통기한 표시일까지

【참가제】

- 참가제(타르색소): 황색4호 ■ 기타 참가제: 히드록시프로필베타글루코오스, 유당수화물, 미결정셀룰로오스, 크로스카르멜로스나트륨, 전분글리콜리나트륨, 이산화규소, 스티아르산마그네슘, 히드록시메틸셀룰로오스, 폴리비닐피롤리돈6000, 산화티타늄, 말크