

고함량 멀티비타민 렛잇브이 프로 PRO^정

비타민·미네랄 함유한 고함량 멀티비타민 렛잇브이프로정

렛잇브이프로정은 활성형 비타민B 3종을 함유하고 있을 뿐만 아니라 현대인들이 결핍되기 쉬운 항산화 성분(CoQ10, 셀레늄, 비타민E) 및 UDCA, 마그네슘, 아연 등 영양소를 포함하고 있어 피로회복 및 영양소 보충에 효과적인 고함량 멀티비타민입니다.

특 장 점

1. 활성형 비타민B 3종 함유
2. 항산화 성분(CoQ10, 셀레늄, 비타민E) 및 UDCA, 마그네슘, 아연 등 영양소 함유
3. 비타민D 1일 1,000IU 함유

효능·효과



육체피로

몸이 나른하고
자도 자도 피로하신 분



근육통, 관절통

근육이 자주 뭉치고
걸리시는 분



빠·이의 발육불량

비타민 부족으로 인해 빠·
차이의 회복, 성장이 더디신 분



눈의 피로

컴퓨터에 스마트폰까지
눈이 침침하고 피로하신 분

[원료약품 및 그분량] - 1정(1000 밀리그램) 중 -

[유효성분]

벤포티아민(KP)..... 100 mg	d-비오틴(USP)..... 0.1 mg	토코페롤아세이트 2형산(KP)..... 40 mg
(타이민염산염으로서 72.31 mg)	폴산(KP)..... 0.1 mg	(비타민 E로서 20 IU)
리보플라빈부티레이트(KP)..... 12 mg	산화아연(KP)..... 20 mg	셀레늄함유조조효모(KP)..... 76.39 mg
니코틴사마이드(KP)..... 10 mg	(아연으로서 16.07 mg)	(셀레늄으로서 41.25 µg)
판토텐산칼슘(KP)..... 50 mg	유비테라네(KP)..... 5 mg	우르소데옥시콜산(KP)..... 10 mg
페리독살포스페이트수화물(KP)..... 5 mg	클레칼시페롤충족분말(EF)..... 10 mg	산화아그네슘(KP)..... 30 mg
시아노코발라민1000배산(KP)..... 50 mg	(비타민 D로서 1,000 IU)(중용유래성분 : 양, 영외)	(마그네슘으로서 18.1 mg)
(시아노코발라민으로서 50 µg)		

[첨가제]

첨가제(중용유래성분) : 유당(젖당)수화물(소, 우유)

기타 첨가제 : 경질무수구산, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 전분글리콜산나트륨, 크로스카르멜로스나트륨, 탈실드주황색(9901714), 탈실드흰색(91W243), 폴리메틸렌글리콜6000, 히드록시프로필셀룰로오스

[성상] 주황색의 타원형 필름코팅정

[효능·효과]

○ 다음 경우의 비타민 D, E, B1, B2, B6의 보급

- 육체피로 - 임신·수유기 - 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시 - 발육기 - 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다.
- 뼈, 이의 발육불량 · 구루병의 예방 · 다음 증상이 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(오(하)리)통, 어깨결림 등),
- 구강염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염 · 각기 · 눈의 피로
- 아연의 보급

[용법·용량] 만 12세 이상 및 성인 : 1일 1회, 1회 1정 복용

* 비타민B군의 함량이 높아 빈 속에 복용 시 일시적으로 속쓰림, 미식거림 등이 있을 수 있으나 식사 후 바로 복용하세요.

[사용상의 주의사항]

1) 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

(1) 고칼슘혈증(hypercalcemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육종증(sarcoidosis: 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장(콩팥)질환 환자 (2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자 (3) 만 12개월 미만의 젖먹이 (4) 신장(콩팥)결석 환자 (5) 심한 중상의 신부전 환자 (6) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2) 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것

(1) 인산염, 칼슘염, 경구약, 복용하는 용 테트라사이클린계 제제, 제산제 (2) 레보도파

(3) 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

(1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 (2) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
① 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다. (3) 소화성궤양, 만성궤양성 대장염, 국한성(특정 부위에 나타나는 대장염 등의 위장질환) 환자 (4) 심장·순환기계기능 장애 환자 (5) 신장(콩팥)장애 환자 (6) 저단백혈증 환자 (7) 신장(콩팥)결석 병력이 있는 환자 (8) 임부

4) 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

(1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 구역, 구토, 설사, 위부(상복부)불쾌감, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 붉은 변, 식욕부진, 복부(배부분)팽만감, 붉은 반점, 부전수소(심장박동정지), 중추신경계 기능 저하, 피부염, 땀·호흡기 자극, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부(배부분)통증, 자열암, 폐부종 (2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다. (3) 에스트로겐을 포함한 경구약(복용하는)용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 D를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증이 위험이 증가될 수 있다. (4) 피리독신을 1일 500mg - 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병성 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다. (5) 돌산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10µg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다. (6) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산 혈증(hyperursemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다. (7) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다. (8) 할랄 드스테르제, 트라마데렌과 병용(함께 복용)투여 시 고칼슘혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것. (9) 우발적 으로 과량복용 한 경우 (10) 개별 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5) 기타 이 약의 복용 시 주의사항

(1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것 (2) 요를 황색으로 변화하게 하여 임신감사치에 영향을 줄 수 있다. (3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용후에는 피할 것

6) 저장상의 주의사항

(1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것 (2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것. (3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장상의 주의사항]

1

어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

2

직광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.

3

오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기간] 제조일로부터 36개월

[포장단위] 60정/병, 120정/상자(60정/병×2)

* 내부 포장에 파손·변질되어 있으면 복용하지 마십시오.
* 본 의약품은 영국의 품질관리를 받은 제품입니다. 만약 구입시 사용기한 또는 유효기한이 지났거나 변질, 변색, 오염되었거나 손상된 의약품은 공상(대량)원고(소)까지 분정해결(중)에 의거, 구입한 약국 및 의약품판매점을 통해 교환 또는 환불받을 수 있습니다.
* 이 첨부문서 최종 개정 연월일 이후 변경된 내용은 대웅제약 홈페이지(www.daewoong.co.kr)
및 소비자상담 전선번호(080-550-8308-9)에서 확인할 수 있습니다.
* 부작용보고 및 피해구제신청 : 한국의약품안전관리원(14-3330, 1644-6223)

판매처 : (주)대웅제약 / 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-14

제조원 : (유)한용제약 / 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주공단6로 301, 봉동로 705

개정년월일 : 2025.09.05



대웅제약

한홍제약